

**Beitrag
zur Coleopterenfauna des steirischen Ennstales
und der angrenzenden Gebiete.**

Von H. Kiefer, Admont und J. Moosbrugger, Feldkirch (Vorarlberg).
(Fortsetzung)

Dermestidae

- Dermestes lardarius* L. Admont, Gams b. H. im Mai—Juni z. hfg. (K) Bdf. (M) O. Zeiring 1 St. (E).
- Attagenus piceus* Oliv. Gesäuse, Spitzenbachgraben (K), Selztal, Bdf. (M).
- Att. pellio* Ol. Admont und Umgebung z. hfg. im Juli (K), O. Zeiring (E).
- Att. punctatus* Scop. Selztal, Bdf. (M).
- Megatoma undata* L. U. v. A. (K), Selztal, Bdf. in Eschenholz (M).
- Anthrenus srcocephulariae* L. Admont (K), Bdf. (M).
- Anth. museorum* L. Admont (K) Bdf. Oppenberg n. selt. (M).
- Anth. fuscus* Oliv. U. v. A. (K), Bdf. (M).
- Trinodes hirtus* F. Selztal, Bdf. (M).

Byrrhidae

- Limnichus sericeus* Duft. U. v. A., Kematen (K), Bdf. (M).
- Simplocaria semistriata* F. Bdf., Selztal n. selt. (M).
- Simplocaria acuminata* Er. Selztal, Strechen, Bst. Kalblinggatterl (M).
- Morychus aeneus* Fab. U. v. A. (K), Bdf. (M).
- Pedilophorus auratus* Duft. Flitzenalm, Selztal, Bdf., Hhd. (M).
- Cytillus sericeus* Forster. U. v. A., Kaiserau, Gesäuse, Pürgg., T.Geb. überall n. selt. (K), Gumpen (M).
- Byrrhus fasciatus* Forst. Selztal, Zeyr. K., Seck. Z., T.Geb. (M) O. Zeiring 2 St. (E).
- Byrrh. fasciatus ab. subornatus* Reitt. (Syn. z. Stammform) U. v. A. (K).

Byrrh. pustulatus Forst. U. v. A., Landl (K), Oppenberg, Kalbling-gatterl (M).

Byrrh. pilula L. U. v. A., Gesäuse, Stein a. M. — Vorberge überall auf Wegen hfg., Landl (K), Sparafeld (M), O. Zeiring 1 St. (E).

Byrrh. luniger Germ. Kematen, Edelgraben b. Frauenberg, T. Geb. n. selt. (K), Selztal, Voralpe (M).

Byrrh. glabratulus Heer. U. v. A., Gesäuse, Johnsbach, T.Geb., E. Rst. einzeln (K), Stoder Z., Voralpe (M).

Byrrh. picipes Duft. U. v. A., Natterriegel selt. (K), T.Geb., Sparafeld, Tbt. (M).

Byrrh. signatus Panz. Bdf., Kaiserau, Oppenberg, Geierkogel, T.Geb. (M).

Byrrh. alpinus Gory. Alpin im ganzen Gebiet hfg., Sparafeld, T.Geb., Bst., Zirbitzk., Geierkogel, Stein a. M., Scheiplalm, Hhd., Tbt. (K u. M.).

Byrrh. gigas Fab. Subalpin auf Moosteppichen: Bdf., Oppenberg, Kaiserau (M), U. v. A. z. hfg., Gesäuse auf Huflatich (K)

Syncalypta paleata Er. Selztal, Bdf. (M).

Dascillidae

Dascillus cervinus L. U. v. A., Spitzenbachgraben, Gesäuse, Zeyr. K., Johnsbach (K), O. Zeiring 1 St. (E), Bdf. (M) n. hfg.

Elateridae

Adelocera fasciata L. U. v. A. einzeln, St. Lorenzen (K), Kaiserau, Knittelfeld (M).

Lacon (Brachylacon) murinus L. U. v. A. im Torfstich hfg., Gesäuse (K).

Lacon (Brachylacon) murinus ab. Kokeili Küst. O. Zeiring 3 St. (E),

Corymbites virens Schrank. U. v. A., Kematen, Gesäuse auf Umbelliferen überall hfg. (K), Bdf., besonders an Gebirgsbächen auf Weiden (M).

Corymbites virens ab. inaequalis Oliv. hfg. unter der Stammform (K u. M.).

Cor. pectinicornis L. U. v. A., Kaiserau, Bst., Gams b. H. überall n. selt. (K).

Cor. cupreus F. Sub- und hochalpin, auch im Tale hfg.: U. v. A., Gesäuse, Tbt. (K), Oppenberg, T.Geb. (M).

Cor. cupreus ab. humeralis Duft. Sub- und hochalpin, auch im Tale hfg. (M), T.Geb., Stein a. M. (K).

- Cor. cupreus v. aeruginosus* F. Sub- und hochalpin hfg. (M) U. v. A., Kaiserau, Geierkogel, Stein a. M., [Koralpe] (K).
- Cor. purpureus* Poda. U. v. A., Gesäuse einzeln (K), Oppenberg (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- Cor. sjællandicus* Müll. (*tesselatus* L.) U. v. A. und Gesäuse auf sumpfigen Stellen, besonders auf Germer hfg. (K).
- Cor. sjællandicus* Müll. (*tesselatus* L.) ab. *assimilis* Gyll. n. selt. unter der Stammform (K).
- Cor. sjællandicus* Müll. (*tesselatus* L.) ab. *virgulatus* Schwz. U. v. A. selt. (K).
- Cor. infuscatus* Eschsch. (*Selatosomus montivagus* Ros.) Gesäuse, Tbt. je 1 St. (M).
- Cor. (Selatosomus) impressus* F. U. v. A. (K), Bdf., Stainach, Kainisch (M).
- Cor. (Selatosomus) impressus ab. rufipes* Schils. Selztal (M).
- Cor. (Sel.) aeneus* L. Gams b. H. (K), O. Zeiring 3 St. (E).
- Cor. (Sel.) aeneus ab. germanus* Voet. Oppenberg, U. v. A., Gesäuse, Gumpeneck z. selt. (K u. M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Cor. (Sel.) aeneus ab. viridinitens* Voet. U. v. A., Landl z. selt. (K), O. Zeirg. 1 St. (E).
- Cor. (Sel.) aeneus ab. cyaneus* Marsh. Oppenberg, Tbt. (M).
- Cor. (Sel.) rugosus* Germ. Besonders in den Zentralalpen hochalpin unter Steinen ober der Baumgrenze n. selt.: Geierkogel, Hschw., Zirbitzk., Himmeleck, Bst. (K u. M); jedoch auch am Stoderz. auf Kalk und 1 St. auf der Straße bei Rottenmann. Nirgends so zahlreich wie am Zirbitzk. (M).
- Cor. (Sel.) bipustulatus* L. U. v. A. (K).
- Cor. (Sel.) affinis* Payk. Hhd. Scheiplalm auf Latschen (M).
- Cor. (Sel.) incanus* Gyll. In den Moorwiesen der Umgebung von Admont auf Umbelliferen hfg. (K).
- Cor. (Sel.) incanus v. ochropterus* Steph. U. v. A. seltener (K), Selztal (M).
- Cor. (Sel.) guttatus* Germ. Sub- und hochalpin im Grase: Stein a. M., Geierkogel, Voralm (K) Kaiserau, Oppenberg, Seck. Z., Bst. Sengsen G. (M).
- Prosternon tesselatum* L. (*holosericeus* Ol.) U. v. A. auf Ennswiesen n. selt. (K), Oppenberg (M).
- Hypoganus cinctus* Payk. Bdf., Oppenberg (M).
- Hyp. cinctus v. semitestaceus* Pic. O. Zeiring 1 St. (E).
- Sericus brunneus* L. U. v. A. auf Umbelliferen hfg. (K), Oppenberg, Hhd. (M).

- Ser. brunneus* a. *tivialis* Redtb. U. v. A. n. selt. (K), Triebenstein (M).
Ser. subaeneus W. (Redtb.) U. v. A., Kematen (K), T. Geb., Bdf. (M).
Ser. subaeneus ab. ♀ *xanthodon* Maerk. Kematen (K), Hochtor (M).
Dolopius marginatus L. U. v. A. hfg., Gesäuse (K).
Agriotes aterrimus Payk. Zirmitz b. H. (K), Selztal, Bdf. (M).
Agr. ustulatus Schall. U. v. A., Gams b. H., Gesäuse hfg. (K).
Agr. ustulatus ab. *flavicornis* Panz. Gesäuse n. selt. (K), Selztal (M).
Agr. elongatus Marsh. (*pilosus* Panz.) Stein a. M. (K), Selztal (M).
Agr. sputator L. Gesäuse, U. v. A. (K) Oppenberg, Bdf., Aussee (M).
Agr. obscurus L. U. v. A., Gams b. H. auf Moorwiesen n. selt. (K) Bdf. (M).
Agr. obscurus ab. *badius* Müll. U. v. A. auf Moorwiesen n. selt. (K).
Synaptus filiformis F. U. v. A. auf Moorwiesen n. selt. (K) Bst. (M).
Adrastus limbatus ab. *axillaris* Er. Selztal, Gesäuse, Bst. (M).
Adr. lacertosus Er. U. v. A. (K), Bdf. (M).
Adr. nitidulus ab. *pallens* Er. Bd. (K), Selztal (M).
Adr. rachifer Fourcr. (Geoffr.) Bdf. (K), Selztal, Oppenberg (M).
Hyponoidus (*Cryptohypnus*) *riparius* F. Bdf. (K), Oppenberg, Hhd. (M).
Hyp. (*Crypt.*) *rivularius* Gyll. Bdf. (M).
Hyp. (*Crypt.*) *frigidus* Kiesw. Hochalpin unter Steinen: Hhd., E. Rst. (K), Hschwg., Hgr. (M).
Hyp. tenuicornis Germ. Selztal (M).
Hyp. dermestoides Hrbst. Selztal, Hhd., Hgr. (M).
Hyp. dermestoides v. *tetraphagus* Germ. Selztal, Bdf. (M).
Hyp. dermestoides a. *bipustulatus* Schils. Selztal, Oppenberg (M).
Hyp. meridionalis Cast. (Lap.) Bdf. (M).
Quasimus (*Hyp.*) *minutissimus* Germ. Bdf., Gams b. H., Mautern n. selt. (M).
Cardiophorus ruficollis L. U. v. A. (K), Bdf., Selztal, Oppenberg (M).
Card. nigerrimus Er. Gams b. H. (K), Bdf., Kraubath (M).
Card. atramentarius Er. Bdf., Kraubath (M).
Melanotus rufipes Herbst. U. v. A. n. selt. (K), Sengs. G. (M), O. Zeiring 2 St. (E).
Mel. rufipes ab. *bicolor* F. U. v. A. (K).
Mel. crassicollis Er. Stainach (M).
Mel. punctolineatus Pel. Selztal, Windischgarsten (M).
Idolus picipennis Bach. Selztal, Gesäuse, Paß Stein (M).

- Elater cinnabarinus* Esch. Gesäuse (K), Selztal (M).
- El. sanguineus* L. Leichenberg b. H., St. Lorenzen i. Paltental, Gams b. H. (K), O. Zeiring 2 St. (E).
- El. pomoneae* Steph. U. v. A. an der Enns und Aigen im Moor hfg. (K), Selztal, Kainisch (M).
- El. sanguinolentus* Schrank. U. v. A., Spitzbachgraben n. selt. (K), Bdf., Kainisch (M).
- El. sanguinolentus* ab. *immaculatus* Schauf. Krumau b. A. (K).
- El. ferrugatus* Lač. U. v. A. und Hall einzeln (K), Selztal, Oppenberg (M).
- El. elongatulus* F. Aigen b. A., Gesäuse (K), Oppenberg (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- El. balteatus* L. U. v. A. z. hfg. (K), Oppenberg (M).
- El. nigroflavus* Goeze. U. v. A. (K), Bdf. (M).
- El. nigroflavus* ab. *podolicus* Reitt. Gesäuse (K).
- El. sinuatus* Germ. Windischgarsten 22. Mai 1923 (M).
- El. erythrogonus* Müll. Selztal, Bdf., Stainach, Kainisch (M).
- El. tristis* L. Selztal am Moor in morschem Zaunholz (M).
- El. nigrinus* Herbst. (Payk.) U. v. A. auf Moorwiesen z. hfg., Kreuzkogel, Pyhrgas (K), Hhd. (M).
- El. aethiops* Lac. U. v. A., Hgr., Oedensee b. Kainisch, St. Lorenzen i. P. (K), Hhd. (M).
- Limonius aeruginosus* Oliv. U. v. A., Hall b. A. und Kaiserau auf moorigen Wiesen hfg. (K).
- Lim. minutus* L. U. v. A. (K), Selztal, Bdf. (M).
- Pheletes aeneoniger* De Geer. Kematen b. A., T. Geb., Stein a. M. (K).
- Phel. quercus* Ol. Spitzbachgraben b. St. Gallen (K), Gesäuse (M).
- Athous hirtus* Herbst. U. v. A. n. selt., Gesäuse, Spitzbachgraben (K).
- Ath. niger* L. U. v. A., Geierkogel, Hschwg., Landl, Spitzbachgraben, Pürgg überall n. selt. (K).
- Ath. vittatus* Fabr. U. v. A., Kaiserau, Kematen (K), Oppenberg (M).
- Ath. vittatus* ab. *inopinatus* Buyss. Gesäuse, Kaiserau (K), Oppenberg (M).
- Ath. vittatus* a. *Stephensis* Buyss. Kalblinggatterl, Selztal (M).
- Ath. vittatus* a. *filicti* Buyss. Bdf. (M).
- Ath. vittatus* v. *Ocskayi* Kiesw. Selztal, Oppenberg (M).
- Ath. vittatus* a. *impallens* Buyss. Bdf. (M).
- Ath. vittatus* a. *angularis* Steph. Selztal, Oppenberg (M).

- Ath. vittatus a. dimidiatus* Drap. Hall b. A., Gesäuse (K).
Ath. vittatus a. tenuevittatus Reitt. U. v. A. n. selt., T.Geb. (K)
Oppenberg (M).
Ath. haemorrhoidalis F. Auf sumpfigen Wiesen und Mooren der
U. v. A. und Kaiserau hfg. (K).
Ath. haemorr. a. ruficaudis Gyll. (Syn. zur Stammform). Auf
Sumpfwiesen bei Admont und Kaiserau n. selt. (K).
Ath. haemorr. a. leucophaeus Lac. Selztal, Gesäuse (M).
Ath. subfuscus Müll. U. v. A. und Kematen, T.Geb., Hgr. hfg. (K).
Ath. subfuscus a. polonicus Reitt. Auf Moorwiesen der U. v. A.
n. hfg., Gesäuse, T.Geb. (K).
Ath. Zebei Bach, hfg. auf Fichten: Bdf., Kaiserau, Kainisch, Op-
penberg (M), U. v. A., T.Geb. n. selt. (K).
Ath. austriacus Desbr. hfg. im Grase U. v. A., Pleschalm (K),
Bdf., Selztal, Hohentauern (M).
Ath. bicolor Goeze (*longicollis* Oliv.) Kammern, Leoben (M).
Denticollis rubens Piller. Auf Gesträuch selt. Gesäuse (K), Selz-
tal, Ardning, Rottenmann (M).
Dent. linearis L. U. v. A., Ennsufer (K), Bdf. (M).
Dent. linearis a. variabilis De Geer. U. v. A., Hall, Veitlgraben
n. selt. (K), Bdf. (M).
Dent. linearis a. mesomelas L. Gesäuse, Oppenberg, Bdf. (M).
Dent. linearis a. suturalis Duft. Bdf. (M).

Eucnemidae

- Dirrhagus pygmaeus* F. Gesäuse, Bdf., Wörschach (M).
Throscus (Trixagus) dermestoides L. Selztal, Bdf., Gesäuse n.
selt. (M).
Throscus (Trix.) carinifrons Bonv. Selztal, Bdf., Stainach (M).
Drapetes biguttatus Pill. Auf Salix in Wörschach 4. Juni (M).

Buprestidae

- Lampra (Poecilonota) rutilans* Fab. Auf einer Ennswiese nahe
dem Grabnerhofe b. Admont 1 St. (K), det. Dr. Franz.
Lampra (Poec.) decipiens Mann. Auf Grauerle in Bdf. 26. VII.
1930 (M).
Buprestis rustica L. U. v. A., Girn, St. Lorenzen i. P., Gesäuse
(♂♀ in copula) Johnsbach (K) n. selt., O. Zeiring 1 St. (E).
Bupr. rustica a. signaticeps Fleisch. U. v. A., Gesäuse (K), Op-
penberg, Kalblinggatterl (M), O. Zeiring 2 St. (E).

- Bupr. rustica* a. *bisornata* Fleisch. U. v. A. (K), Bdf. (M). O. Zeiring 1 St. (E).
- Anthaxia nitidula* L. Selztal, Bdf. (M).
- Anth. morio* Fab. U. v. A. (K), Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Anth. helvetica* Stierl. Admont (Strobl), Gesäuse, Spitzenbachgraben, Scheiplalm (K), Obdach (K), O. Zeiring 1 St. (E).
- Anth. quadripunctata* L. Gesäuse, Obdach (K), Selztal, Oppenberg (M), hfg. O. Zeiring 2 St. (E).
- Chrysobothris chrysostigma* L. Selztal, Bdf. (M).
- Coraebus sinuatus* (*lampsanae* Bon.) Kraubath (M).
- Agrilus biguttatus* F. Bdf. auf Eichengebüsch (M).
- Agr. sinuatus* Ol. Selztal (M).
- Agr. subauratus* Gebl. Windischgarsten (M).
- Agr. viridis* a. *linearis* F. Kreuzkogel auf einem Schneefleck 1 St. (K).
- Agr. viridis* a. *nocivus* Fab. (Ratz.) Selztal, Oppenberg (M).
- Agr. viridis* a. *fagi* Ratzeb. Bdf. (M.)
- Agr. viridis* v. *mixtulus* Obbg. Selztal (M).
- Agr. coeruleus* Rossi. Selztal, Sunk b. Trieben, St. Michael (M).
- Agr. betuleti* a. *Fuegneri* Obbg. (v. *tristis* Fügn.) Selztal (M).
- Agr. laticornis* Illig. Bdf. (M).
- Agr. convexicollis* Redt. Bdf. (M).
- Agr. integerrimus* Ratzeb. U. v. A., Gesäuse n. selt. (K).
- Aphanisticus pusillus* Oliv. Selztal (M).
- Trachys minuta* L. U. v. A., Gesäuse (K), überall hfg. (M).
- Trachys troglodytes* Schönh. (Gyll.) Windischgarsten (M).

Lymexylidae

- Hylecoetus dermestoides* L. Hall b. A. ♂♀ Kaiserau, Gesäuse, U. v. A. (K), Selztal, Oppenberg (M).
- Hyl. dermest. a.* ♂ *Marci* L. Bdf., Kaiserau (M).
- Hyl. dermest. a.* ♂ *morio* F. Bdf., Selztal (M).

Bostrychidae

- Stephanopachys substriatus* Payk. U. v. A. (K), Selztal, Kaiserau, Bdf., Landl (M).

Plinidae

- Niptus hololeucus* Falderm. U. v. A. (K), Rottenmann (M).
- Tipnus (Niptus) unicolor* Piller. Bdf. n. selt., Oppenberg (M).
- Ptinus coarcticollis* Strm. Bdf. 12. IX. 1930 (M).

Pt. fur L. U. v. A. n. selt. (K).

Pt. bicinctus Strm. Bdf. (M).

Pt. pilosus Müll. Bdf. (M).

Pt. subpilosus Strm. Bdf., Triebenstein, Kalblinggatterl (M).

Pt. raptor Strm. Bdf., Oppenberg (M).

Anobiidae

Hedobia imperialis L. Selztal, Bdf., Oppenberg, Liezen (M).

Hedobia regalis Duft. Admont (mit dieser Fundortsangabe ein-
getauscht!) (M).

Dryophilus pusillus Gyll. Bdf., Oppenberg, Arling hfg. (M).

Episernus striatellus Bris. Bdf. (M).

Ep. granulatus Weise. Bdf., Scheiplalm (M).

Ernobius nigrinus v. politus Redt. Hhd. (M).

Er. angusticollis Ratzb. Bdf. (M).

Er. angusticollis v. parvicollis Muls. Bdf. (M).

Er. abietis F. Selztal, Bdf., Kaiserau (M).

Er. abietinus Gyllh. Bdf., Kaiserau, Wörschach (M).

Er. mollis L. Bdf. n. selt., Bst. (M).

Anobium pertinax L. Selztal, Bdf., Oppenberg (M).

An. emarginatum Duft. Auf Fichten: U. v. A. (K), Bdf., Spital
a. P. (M).

An. punctatum Deg. (*striatum* Oliv.) U. v. A., Gesäuse n. selt.
(K), Bdf. (M).

An. fulvicorne Sturm. Bdf. (M), Zeyr. K. (K).

Stegobium paniceum L. (*Sitodrepa panicea* L.) Admont (K), Bdf.
(M).

Ptilinus pectinicornis L. U. v. A. (K), Bdf., Gesäuse (M).

Xyletinus ater Creutz. Selztal, Wörschach (M).

Xyl. oblongulus Muls. Bdf. an einem Apfelbaum (M).

Dorcatoma dresdensis Herbst. Bdf. (M).

Caenocara bovistae Hoffm. Bdf., Wörschach n. selt. (M).

Oedemeridae

Calopus serraticornis L. Admont und Umgebung ♂♀ an Mauern
und ans Licht geflogen (K), Bdf., Selztal (M) O. Zeiring 1 ♀ (E).

Nacerda (Anoncodes) rufiventris Scop. Spitzenbachgraben 1 ♀
(K), Selztal Gesäuse, Bdf. (M).

Nacerda (Anon.) rufiventris a. limbicollis Reitt. 1 ♂ 1 ♀ Ge-
säuse (M).

- Nacerda (Anon.) fulvicollis* Scop. U. v. A. ♂ und ♀, Kaiserau, Spitzbachgraben (K), Bdf. (M).
- Asclera (Ischnomera) sanguinicollis* F. Windischgarsten 22. V. 1923 (M).
- Chrysanthia viridissima* L. Admonterhaus 1 ♂, Kreuzkogel 1 ♀, Spitzbachgraben 2 ♂♂ (K), Bst. (M).
- Chrys. viridis* Schmidt. U. v. A. und Selztal auf Sumpfwiesen (K).
- Oedemera flavipes* F. Kraubath, Mautern (M).
- Oed. femorata* Scop. (*flavescens* L.) Hall b. A., Gesäuse (K), Bdf. (M).
- Oed. subulata* Oliv. Pürgg. (M).
- Oed. tristis* Schmidt. Spitzbachgraben, Gesäuse (K), Hhd., Selztal (M).
- Oed. virescens* L. Gesäuse (Johnsbach, Sulzkarhund), Kematen, E. Rst. (K), Liezen (M).
- Oed. lurida* Marsh. Natterriegel, E. Rst. (K), Selztal, Bdf. (M).

Pythidae

- Phyto depressus* L. Selztal ♂♀ am Krummholz unter der Rinde im Moor (M).
- Lissodema 4-pustulatum* Marsh. Bdf. (M).
- Salpingus aeratus* Muls. (*Sphaeriestes aeneus* Reitt.) Bdf. (M).
- Salp. (Sphaer.) castaneus* Panz. Bdf., Wörschach, Mautern (M).
- Rabocerus (Sph.) multilatus* Beck. An dürren Ästen: Bdf., Stainach, Flitzenalm, Kaiserau (M).
- Rab. (Sph.) foveolatus* Ljungh. Zahlreich an anbrüchigen Grünernen Hhd., Bst. (M).
- Rab. (Sph.) Gabrieli* Gerh. An verpilzten Grauerlen Bdf. bei 1100 m, Kaiserau (M).
- Rhinosimus ruficollis* L. Kaiserau, Strechen, Bdf., Sunk b. Trieben (M).
- Rhin. planirostris* F. Bdf., Selztal, Strechen hfg. (M).

Pyrochroidae

- Pyrochroa coccinea* L. St. Lorenzen i. P. (K) Selztal, Oppenberg (M).
- Pyr. serraticornis* Scop. O. Zeiring 1 St. (E).
- Schizotus (Pyr.) pectinicornis* L. Gesäuse (K) Selztal, Paß Stein (M).

Aderidae (Hylophilidae)

- Aderus (Hylophilus) populneus* Panz. Bdf., Mautern an Zwetschgenbäumen (M).
- Aderus (Hyl.) pygmaeus* De Geer. Bdf. auf Eiche (M).

Anthicidae

Anthicus floralis L. Selztal, Bdf. (M).

Anth. quisquilius Thoms (*floralis v. formicarius* Goeze). Bdf. n.
selt. in Dünger (M).

Meloidae

Meloe proscarabaeus L. U. v. A. und Hall b. A. an feuchten Stel-
len z. selt. (K), Bdf., Mautern (M).

Meloe violaceus Marsh. U. v. A., Gams b. H. n. selt. (K), Trieben-
feldkogel (Wolf).

Meloe brevicollis Panz. U. v. A. z. selt. (K), St. Michael ob Le-
oben (M).

Meloe rugosus Marsh. Selztal, Bdf. (M).

Meloe scabriusculus Brdt. Oppenberg (M).

Lytta vesicatoria L. Admont am Bahnhof anfangs Juni 2 St. ge-
funden (K).

Rhipiphoridae

Metoecus paradoxus L. Bdf. im Juli 1930 von Gesträuch geklopft
(M.).

Mordellidae

Tomoxia biguttata Gyll. Bdf., Wörschach (M).

Mordella maculosa Naezen. Selztal, Bdf., Liezen (M).

Mord. fasciata F. Selztal, gemein (M).

Mord. aculeata L. Kematen (K), Bdf. hfg. (M).

Mordellistena abdominalis F. Mühlau (K), Selztal, Bdf., Gesäuse (M).

M. humeralis L. (Oliv.) Gesäuse, Selztal, Bdf. (M).

M. variegata F. (*lateralis* Oliv.) Gesäuse, Bdf. (M).

M. parvula Gyll. Bdf. n. selt., Kraubath (M).

M. brevicauda Boh. Bdf., Wörschach, Mautern (M).

Mordellistena pumila Gyll. Selztal, Bdf., Stainach (M).

Anaspis frontalis L. U. v. A., Kematen (K), Bdf., Scheiplalm n.
selt. (M.).

An. thoracica L. Bdf., Selztal, Gams b. H. (M.).

An. ruficollis F. Bdf., Selztal, Hhd. (M.).

An. rufilabris Gyll. Bdf., Oppenberg, Gesäuse (M.).

Serropalpidae (Melandryidae)

Tetratoma ancora a. obscurior Pic. Scheiplalm (K), Bdf., Hhd. n.
selt., zugleich mit *Sphaeristhes foveolatus* (M.).

- Hallomenus binotatus* Quens. Bdf., Selztal (M).
Orchesia minor Walk. hfg. an dürren Ästen: Bdf., Hhd., Oppenberg (M).
Or. undulata Kr. Bdf., Selztal, Kaiserau, Johnsbach (M).
Or. grandicollis Rosenh. Im Frühjahr in Laublagen und aus Moos gesiebt: Bdf., Selztal, Oppenberg, Kaiserau, Hhd. (M).
Anisoxya fuscula Illig. Bdf., Kalblinggatterl (M).
Phloeotrya rufipes Gyll. Bdf., Kammern (M).
Phlo. rufipes a. testaceipennis Pic. Bdf. (M).
Xylita laevigata Hellenius (*buprestoides* Payk.) Selztal, Bdf., Wörschach (M), O. Zeiring 3 St. (E).
Xylita livida Sahlb. Bdf., Kaiserau, Sunk b. Tr. (M).
Serropalpus barbatus Schall. Selztal (M).
Zilora sericea Sturm. Kalblinggatterl (M).
Melandrya caraboides L. Spitzenbachgraben im Juni (K), Selztal, Bdf. (M).
Mel. barbata F. Klein Reifling (M).
Conopalpus testaceus v. flavicollis Gyll. Bdf., in dürren Haseln (M).

Lagriidae

- Lagria hirta* L. Selztal, Bdf. hfg. (M).

Alleculidae

- Hymenalia rufipes* F. Leoben (M).
Gonodera luperus Herbst. Gesäuse, Mautern (M).
Pseudocistela (Gonod.) ceramboides L. Bdf., Pürgg, Kraubath (M).
Isomira (Gon.) murina L. Bdf., Oppenberg (M).
Gon. semiflava Küst. Bdf., Wörschach (M).
Mycetochara humeralis F. Admont, Bdf. (M).
Omophlus rufitarsis Leske. Kraubath (M).

Tenebrionidae

- Blaps mortisaga* L. Gams b. H. 2 St. im Juni (K), Admont (Bahnhof) im Juli 1924 1 St. (leg. Julius Pölzer).
Crypticus quisquilius L. Kraubath (M).
Eledona agricola Herbst. Admont z. hfg. (M).
Scaphidema metallicum a. bicolor F. Bdf., Selztal, Oppenberg, Stainach (M).
Platydema violacea F. Bdf., Selztal n. selt. an *Sambucus niger* in dem „Judasohr“ genannten Pilz (M).
Hypophloeus unicolor Piller. Selztal n. selt. (M).

Hip. linearis F. Bdf. n. selt. (M).

Tribolium castaneum Hbst. (*navale* F.) Bdf. (M).

Cnathocerus cornutus F. Admont 1 St. im Mai in einer Semmel gefunden. (K).

Uloma (Melasia) Perroudi Muls. Admont, unter Holz im Juli 3 St., Krumau b. A. im Holzschatz 21. X. und Leichenberg b. Hall 1 St. unter Rinde im März (K), Bdf. (M).

Tenebrio molitor L. U. v. A., Gams b. Hieflau, Gesäuse n. selt. (K).

Laena viennensis Sturm. Mautern, St. Michael (M).

Cylindronotus (Helops) lanipes L. Kraubath (M).

Cerambycidae

Spondylis buprestoides L. U. v. A. n. selt. im August (K), Bdf. (M).

Prionus coriarius L. Gams b. H., U. v. A., Leichenberg b. Hall, Kematen einzeln vom Juni bis August (K), Bdf. (M).

Ergates faber L. Scharsdorf b. Trofaiach im August ♂♀ (leg. Samb's).

Tragosoma depsarium L. Gams b. H. 1918 1 ♂ (leg. Johanna Kiefer), Mühlau (Elektrizitätswerk) im September 1 ♀ ans Licht geflogen (leg. Wölger).

Rhagium mordax Deg. K. v. A., Gesäuse, Mühlau hfg. (K), Bdf., Oppenberge (M).

Rhag. bifasciatum F. U. v. A. (K), Oppenberge (M).

Rhag. bifasciatum a. unifasciatum Muls. K. v. A. (K).

Rhag. inquisitor L. Gesäuse, Bdf., Selztal (M), O. Zeiring 4 St. (E).

Toxotus (Oxymirus) cursor Lin. Krumau b. A., Kematen, Gesäuse, Sulzkarhund (K) z. hfg., Himmeleck (leg. Wolf), Oppenberge (M).

Tox. (Oxymirus) cursor a. ♀ niger Letzn. Gesäuse 1 ♀ im Juni (K), O. Zeiring 1 goldgelb behaartes Weibchen (E).

Tox. (Oxymirus) cursor a. lineatus Letzn. Spitzenbachgraben 1 ♀ im Juni (K), Tbt. (M).

Tox. (Oxymirus) cursor a. Verneuli Muls. Hoffeld b. A. 1 St. im April an einem Zaun hinter einer Eiche (K).

Stenochorus meridianus L. Bdf., Oppenberge (M).

Stenochorus meridianus a. cantharinus Herbst. Bdf. (M).

Pachyta lamed L. Oppenberge, Bdf. (M).

Pach. lamed. a. nigrina Pic. Gesäuse Ende Juli 1 St., Zirmitzalm in Hall im August 1 St. (K).

Pach. quadrimaculata L. Kematen hfg. auf Doldenblüten (K), Bdf., Oppenberge (M).

- Evodinus clathratus* F. Gesäuse (K), Oppenberg, Hgr., Paß Stein (M).
- Ev. clathratus* a. *brunnipes* Muls. Veitlgraben (K), Oppenberg, Selztal, Hhd., Gesäuse (M).
- Acmaeops septentrionis* a. *simplonica* Strl. Gesäuse 1 St. (M).
- Ac. collaris* L. U. v. A. n. selt. (K), Bdf. (M).
- Ac. pratensis* Laich. Selztal, Oppenberg, Paß Stein (M).
- Gaurotes virginea* L. Gesäuse (Sulzkarhund), Spaltenbachgr., U. v. A. (K), Oppenberg (M).
- Gaurotes virginea* ab. *thalassina* Schrk. Bdf. (M).
- Cortodera femorata* F. Pürgg, zahlreich an blühenden Legföhren, Bdf., Stainach, Strechengraben von Fichten (M).
- Pidonia lurida* F. Gesäuse (K), Selztal, Bdf., Gams b. H. (M).
- Nivellia sanguinosa* Gyll. An *Aruncus silvester* in Selztal (M).
- Leptura livida* F. Selztal, Gesäuse (M).
- Lep. fulva* Deg. Gesäuse (K), Selztal (M).
- Lep. maculicornis* Deg. U. v. A., Kaiserau, Spaltenbachgr. (K), Oppenberg (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Lep. rubra* L. U. v. A., Gesäuse, Hohentauern, Zeiritzalm (K) überall nicht selt., Scharsdorf b. Trofaichach ♂♀ (leg. Obl. Samb.).
- Lep. scutellata* F. Gesäuse im Juli 1 St. (K).
- Lep. virens* L. Gesäuse, Spaltenbachgr. [Koralpe (Vorberge) unter 1800 m] z. hfg. (K), Oppenberg (M).
- Lep. virens* a. *canescens* Reitt. [Koralpe unter 1800 m], Kaiserau, Strechau (K).
- Lep. sanguinolenta* L. Kaiserau, U. v. Landl (K), Oppenberg (M).
- Lep. dubia* Scop. Gesäuse, Landl im Juli je 1 ♂ (K), Oppenberg (M).
- Lep. dubia* a. *limbata* Laich. Selztal (M).
- Lep. dubia* a. *chamomillae* F. Gesäuse (M).
- Judolia* (Lept.) *cerambyciformis* Schrank. Landl, Zeyritzalm (K).
- Jud. (Lept.) cerambyciformis* a. *10-punctata* Oliv. Kaiserau (K), Selztal (M).
- Jud. (Lept.) cerambyciformis* a. *6-punctata* Muls. Selztal (M).
- Jud. (Lept.) cerambyciformis* a. *bisbistigma* Pic. Kaiserau (K).
- Jud. (Lept.) sexmaculata* L. Strechau, Koralpe (K), Selztal, Gesäuse, Bdf. (M).
- Jud. (Lept.) sexmaculata* a. *trifasciata* Fab. Selztal, Trieben (M).
- Strangalia* (Lept.) *pubescens* F. Spaltenbachgr., Gesäuse im Juni, Juli n. selt. (K).

- Strang.* (*Lept.*) *pubescens* a. *perobscura* Reitt. Gesäuse (M).
Strang. (*Lept.*) *pubescens* a. *auriflua* Redtb. Gesäuse, Spitzengr. (K).
Strang. (*Lept.*) *quadrifasciata* L. U. v. A., Gesäuse, Strehau, Walchengraben b. Oeblarn einzeln (K), Bdf. (M).
Strang. (*Lept.*) *maculata* Poda. Spitzengraben, Gesäuse, Kamleralm ob Hall, Schafferweg ob Admont hfg. (K).
Strang. (*Lept.*) *maculata* a. *undulata* Muls. U. v. A. (K), Gesäuse (M).
Strang. (*Lept.*) *maculata* a. *sinuata* Fab. Selztal, Gesäuse (M).
Strang. (*Lept.*) *arcuata* Panz. Selztal auf sumpfigen Wiesen, Gesäuse, Strehau z. selt. (K), Oppenberg (M).
Strang. (*Lept.*) *aethiops* a. *Letzneri* Gabr. Selztal (M).
Strang. (*Lept.*) *melanura* Lin. U. v. A., Kaiserau, Gumpeneck (K), Oppenberg (M), O. Zeiring 1 St. (E).
Strang. (*Lept.*) *bifasciata* Müll. Leoben 1 St. (M).
Strang. (*Lept.*) *nigra* L. Selztal, Gams b. H. (M).
Strang. (*Lept.*) *attenuata* L. Aigner Sumpfwiesen im Juli selt. (K).
Alosterna tabacicolor Deg. U. v. A. (K), überall hfg. (M), O. Zeiring 2 St. (E).
Grammoptera ruficornis Fab. Krumauer Torfstich im Mai (K), Spitzengraben im Juni (K), Selztal (M).
Molorchus (*Caenoptera*) *minor* L. U. v. A., Gesäuse, Kematen, Spitzengraben im Juni stellenweise n. selt. (K), Selztal, Bdf. (M).
Caenoptera umbellatarum Schreb. Bdf., Selztal (M).
Obrium brunneum Fab. Gesäuse im Juni, Juli n. selt. (K), Selztal, Bdf. (M).
Gracilia minuta Fab. U. v. A. im September selt. (K).
Saphanus piceus Laich. Admonter Sägeplatz 1 ♂ im Juli, Gesäuse 25. VI. 1 ♂, 2 ♀♀ (K), Bdf., Oppenberg, Selztal, Haus, Aich n. selt. an dürren Stämmen und Ästen von Grauerlen und Haseln (M), O. Zeiring 1 ♂, 1 ♀ (E).
Criocephalus rusticus L. Admont am Licht im August 2 ♀♀, U. v. A. und Gesäuse n. selt. (K), Bdf. (M), O. Zeiring 2 St. (E).
Asemum striatum L. U. v. A., Spitzengraben einzeln (K), Bdf. (M).
As. striatum a. *agreste* Fab. U. v. A., St. Lorenzen i. P. (K).
Tetropium castaneum L. Landl, Erzberg auf Fichtenholz einzeln (K), Scharsdorf b. Trofaiachach 1 St. (Obl. Sambs).
Tetr. castaneum v. *luridum* L. O. Zeiring 1 St. (E).

- Tetr. castaneum a. aulicum* F. Aigen b. A. im Mai, Landl, Hohen-tauern (K), Bdf. (M).
- Tetr. castaneum a. fulcratum* F. Wörschach, Oppenberg, Bdf. (M).
- Tetr. fuscum* Fab. Stainach (M).
- Tetr. Gabrieli* Ws. Kaiserau, Bdf., Strechen (M).
- Phymatodes testaceus a. variabilis* L. Admont 19. Februar 1 St. ins Zimmer geflogen. U. v. A. (K), Bdf., (M).
- Anisarthron barbipes* Schrk. Auf Eiche in Bdf. (M).
- Callidium aeneum* Deg. Rötstein b. A. 1 St. (leg. Pölzer) Spitzbachgraben im Juni 2 St. (K), Selztal (M).
- Call. violaceum* L. U. v. A., Gams b. H. n. selt. (K), Scharsdorf b. Trofaiach 1 St. (Obl. Samb s), Bdf., Oppenberg (M), O. Zeiring 4 St. (E).
- Call. violaceum a. virescens* Stierl. (*subvirens* Reitt.) U. v. A. 2 St. (K).
- Call. coriaceum* Payk. Gesäuse 27. Juli 1 St. (K), Selztal, Eisen-erz je 1 St. auf Holzklaftern (M).
- Hylotrupes bajulus* L. U. v. A., Johnsbach, Gesäuse, Gams b. H., St. Lorenzen i. P. n. selt. (K), Bdf. (M).
- Ropalopus hungaricus* Herbst. Gams im Juli, Hohen-tauern im August je 1 St. (K), Bdf. (M).
- Rosalia alpina* L. Gesäuse im Juli, August in beiden Geschlechtern in Buchenschlägen (K), Gams b. H. 2 St. (leg. Hannerl Kiefer).
- Aromia moschata* L. Admont und Umgebung auf Doldenblüten (Bärenklaue, Schierling, etc.) in der Nähe von Weiden im Sonnenschein n. selt. von Juli bis September (K).
- Aromia moschata a. auctumnalis* Westh. U. v. A. im August ein prächtig purpurrot gefärbtes Stück (K).
- Aromia moschata a. laevicollis* Reittr. Admont, Bdf. (M).
- Clytus arietis* L. Spitzbachgraben im Juni 2 St., Hieflau am Bahnhof im Juli 1 St. (K), Selztal, Oppenberg (M).
- Clytus lama* Muls. Mühlau im Juli, Kreuzkogel je 1 St. (K), Ge-säuse, Oppenberg (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Chlorophorus (Clythantus) sartor* Müll. (F) U. v. A. selt. (K).
- Anaglyptus mysticus* L. U. v. Landl im Juli 1 St. (K), Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Anaglyptus mysticus a. albofasciatus* Deg. (*hieroglyphicus* Herbst) U. v. A. im Juli 2 St. (K).
- [NB. *Dorcadion pedestre* Poda wurde von mir im Jahre 1885 in Graz am oberen Rande einer Sandgrube gegen-

über vom Ostbahnhof unter Graswurzeln in Anzahl gefunden (K).]

Lamia textor L. U. v. A. Im Mai bis Juli einzeln, Gesäuse 1 St. (K).

Monochamus sartor F. Eßlingbett in Hall an Treibholz 1 ♀ 29. August (K), Gesäuse Juli bis September in beiden Geschlechtern oft hfg. an Fichtenstämmen und gefälltem Holz (nicht entrindetem Holz) anzutreffen (K) Med.R. Dr. Genger brachte mir von einem Dienstgang im Gesäuse einmal ca. 20 St. mit (K).

Monochamus sutor L. Ebenso hfg. wie *sartor* und an den gleichen Fundplätzen (K), Hohentauern 1 Pärchen an einem Zaun Mitte Juli (K), Oppenberg, Donnersbach (M).

Monochamus saltuarius Gebl. Gesäuse 22. Mai und Umgebung von Admont 16. Juli je 1 St. (K).

Acanthoderes clavipes Schrank. Gesäuse 10. August 1 St. (K).

Acanthocinus aedilis L. Gesäuse und Mühlauerwald an frischen, nicht entrindeten Holzklaftern stellenweise hfg. im Mai; Admont an Mauerwerk 2 St. (K), Bdf. (M).

Leiopus nebulosus L. U. v. A. im Juni-Juli 2 St. (K), Bdf. hfg. an dürren Zweigen (M).

Pogonochaerus hispidulus Pill. E. Rst. im August 1 St., Bdf. 2 St. (K).

Pog. hispidus L. Bdf. n. selt. (M).

Pog. fasciculatus De Geer. U. v. A. im Mai 2 St. (K), Bdf., Mautern, Kaiserau (M).

Pog. decoratus Fairm. Bdf., Kraubath (M).

Pog. ovatus Goeze. U. v. A. im Juni 1 St. (K).

Anaesthetis testacea F. Bdf. auf Eiche z. selt. (M).

Agapanthia villosoviridescens De Geer. Spitzbachgr. im Juli 1 St. (K), Bdf., Gesäuse (M).

Saperda carcharias L. U. v. A. im Juli, August einzeln (K), Preibichl 1 St. (K), Bdf. (M).

Sap. carcharias a. *grisescens* Muls. U. v. A. Ende September 1 St. (K).

Sap. populnea L. Admont und Krumau einzeln, am 3. Juni ein Pärchen in copula auf einer Weide (K), Bdf. auf Espen n. selt. (M).

Sap. scalaris L. Admont im Schulgarten 2 St. Mitte Juni (leg. Lehrer Kieslinger), Oberhof b. A. an Erlen schwärzend im Juni 1 St. (K), U. v. A. 1 St. (leg. Med. R. Dr. Genger)

Spitzenbachgr. im Juli (K), Bdf., Oppenberg (M), O. Zeiring 2 St. (E).

Tetrops praeusta L. Krumauer Torfstich im Mai 2 St. (K), Bdf. (M).

Tetrops Starcki Chevil. (früher *v. von praeusta*) Bdf. (M).

Stenostola dubia Laich. U. v. A. und Krumau im Mai 2 St. (K).

Phytoecia nigripes Voet. (*affinis* Harr.) Frauenberg b. A. am Weg 1 St. (K), Selztal, Bdf. (M).

Phyt. cylindrica L. U. v. A. und Krumau 2 St. im Juni (K), Selztal (M).

Phyt. nigricornis F. Selztal, Oppenberg, Gesäuse, Bdf. (M).

Phyt. coerulescens Scop. Selztal, Kraubath (M).

Obera oculata L. Gesäuse im Juli n. selt (K), Selztal, Bdf. (M).

Obera linearis L. Bdf. (M).

Chrysomelidae

Donacia crassipes Fab. Wörschach (M).

Don. clavipes F. Bdf., Selztal, Gaishorn (M).

Don. dentata Hoppe. Selztal, Bdf., Wörschach (M).

Don. versicolorea Brahm. Selztal, Bdf. (M).

Don. aquatica L. Krumauer Moorwiesen im Mai n. selt., Selztal (K), Bdf. (M).

Don. brevicornis Ahr. Liezen (M).

Don. impressa Payk. Krumauer Moorwiesen im Mai hfg. (K), Wörschach (M).

Don. obscura Gyll. Bdf., Pyhrnpaß (M).

Don. thalassina Germ. Selztal (M).

Don. simplex F. Krumauer Moorwiesen selt. (K), Selztal, Bdf. (M).

Plateumaris sericea L. Krumauer Moorwiesen, Stiftsgarten am Teich einzeln (K).

Plat. sericea a. festucae F. Bdf. (M).

Plat. sericea a. micans Panz. Krumauer Moorwiesen und Stiftsgarten am Teich einzeln (K), Bdf. (M).

Plat. sericea a. armata Payk. ebendorf z. selt. (K), Bdf. (M).

Plat. sericea a. nymphaeae F. ebendorf z. selt. (K), Selztal, Bdf. (M).

Plat. discolor Panz. Selztal im Moor n. selt. (K), Bdf., Pyhrnpaß (M).

Plat. braccata Scop. Krumauermoor selt. (K), Bdf., Gaishorn (M).

Plat. consimilis Schrank. Krumauer- und Selztaler Moor z. selt. (K), Oppenberg (M).

- Plat. rustica* Kunze. Veitlgraben (K), Krumauer Moorwiesen z. hfg. (K) Bdf. (M).
- Plat. rustica a. planicollis* Kunze. Krumauer Moor z. hfg. (K).
- Plat. affinis* Kunze. Krumauer Moor nicht so hfg. als die vorigen! (K), Bdf., Wörschach (M).
- Orsodacne cerasi* L. Gesäuse (M).
- Orsodacne cerasi a. glabrata* Panz. Selztal (M).
- Zeugophora subspinosa* F. Selztal (M).
- Zeugophora flavicollis* Marsh. Selztal, Bdf. (M).
- Lema cyanella* L. (*puncticollis* Curt.) Bdf. (M).
- Lema Erichsoni* Suffr. Selztal, Kaiserau, Bdf. (M).
- Lema lichenis* Voet. (*cyanella* Payk.) U. v. A. selt. (M).
- Lema lichenis a. obscura* Steph. Selztal (M).
- Lema melanopa* L. Bdf., Selztal an Getreide n. selt. (M).
- Liliocerus (Crioceris) lili* Scop. U. v. A. und im Stiftsgarten auf *Fritillaria imperialis* (K), Spaltenbachgraben (K), Bdf., Stainach (M), O. Zeiring (4 St. (E).
- Lil. (Crioc.) merdigera* L. Kaiserau, Wörschach, Sunk auf *Lilium martagon* (M).
- Lil. (Crioc.) tibialis* Villa. Treffneralpe bei 1400 m und Sunk bei Trieben je 1 St. auf *Lilium martagon* (M).
- Labidostomis tridentata* L. U. v. A. und Spaltenbachgraben im Juni n. selt. (K), Selztal, Bdf. (M).
- Labid. humeralis* Schneid. Selztal (M).
- Labid. longimana* L. Selztal, Bdf., Stainach (M).
- Clytra quadripunctata* L. U. v. A. (Schafferweg) hfg. (K), Kreuzkogel 1 St. Landl (K).
- Cyaniris (Gynandrophthalma) cyanea* Fab. U. v. A., Kematen z. hfg. (K).
- Cyn. flavicollis* Charp. Gesäuse 1 St. (K) Selztal (M).
- Cyn. affinis* Illig. (Hellw.) U. v. A. und Kematen z. hfg. (K). Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Cyn. xanthaspis* Germ. Windischgarsten (M).
- Coptocephala Scopolina* L. Gesäuse (M).
- Copt. rubicunda* Laich. Gesäuse n. selt. (K), Pürgg (M).
- Cryptocephalus coryli* L. Johnsbach 1 St. (K), Bdf., Gumpeneck (M).
- Cr. octopunctatus* Scop. U. v. A., Gesäuse z. selt. (K), Arling (M).
- Cr. sexpunctatus* L. U. v. A., Gesäuse Kematen, Kaiserau z. hfg. (K).
- Cr. 5-punctatus* Scop. (*signatus* Laich.) Gesäuse 1 St. (K), Kainisch, Bdf. (M).

- Cr. distinguendus* Schneid. Krumauer Moor im Mai und U. v. A. n. selt. (K).
- Cr. disting. a. ochthephilus* Clavar (= *humeralis* Ws.) Selztal (M).
- Cr. disting. a. subdistinguendus* Pic. Selztal (M).
- Cr. disting. a. bihumeralis* Pic. Selztal (M).
- Cr. albolineatus* Suffr. Kreuzkogel auf einem Schneefleck im Juli 1 St. (K), Kalblingboden (1500 m) am 4. Juli 1926 vom Gras gekätschert (M). In der stiftischen Sammlung stecken 2 St. vom Natterriegel und 1 St. vom Kreuzkogel (leg. Strobl). Alle Stücke haben die weiße Längsbinde auf den Flügeldecken und zum Teil auch einen weißen Halbmond-fleck an deren Spitze.
- Cr. biguttatus* Scop. U. v. A., Plöschalm, Hhd. einzeln (K).
- Cr. aureolus* Suffr. Selztal (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Cr. sericeus* L. U. v. A., Kaiserau, Admonterhaus, Bösenstein, [Koralpe bis 1900 m] überall einzeln (K), O. Zeiring 1 St. (E).
- Cr. sericeus a. purpurascens* Ws. Admonterhaus 1 St. (K).
- Cr. sericeus a. pratorum* Suffr. Styria alpes 1 St. (leg. Strobl).
- Cr. hypochoeridis* L. (*cristula* Duf.) U. v. A. 2 St. (K).
- Cr. hypoch. a. frigidus* Jacobs. Selztal (M).
- Cr. violaceus* Laich. Gesäuse, Tbt. z. selt. (K), Selztal (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- Cr. nitidulus* F. U. v. A., Aigner Moor selten (K), Selztal, Bdf. (M).
- Cr. nitidus* L. U. v. A. (K), Selztal, Bdf., Oppenberg (M).
- Cr. punctiger* Payk. Bdf., Selztal (M).
- Cr. pallidifrons* Gyll. Bdf., Selztal (M).
- Cr. parvulus* Müll. Admont (Neu-Amerika) auf Sumpfwiesen 1 St. (K), Selztal, Bdf. (M).
- Cr. marginatus* F. U. v. A. selten (K), Bdf., Selztal (M).
- Cr. pini* L. Krumauer Moor auf Fichten im August 7 St. (K), Bdf., Kalblinggatterl (M).
- Cr. 10-maculatus a. bothnicus* L. Selztal, Bdf. (M).
- Cr. frenatus* Laich. Gesäuse 1 St. (K), Selztal, Bdf. (M).
- Cr. frenatus a. Fabricii* Ws. Selztal (M).
- Cr. Moraei* L. U. v. A., Gstattmeier-Niederalm (Hall) je 1 St. (K).
- Cr. Moraei a. vittiger* Marsh. Oppenberg (M).
- Cr. 4-pustulatus a. rhaeticus* Stierl. (Heyd.) Selztal, Bdf., Hhd. (M).
- Cr. 4-pust. a. aethiops* Ws. Bdf., Gesäuse (M).
- Cr. 4-pust. a. similis* Suffr. U. v. A. und Gesäuse n. selt. (K) det. Dr. Franz.
- Cr. flavipes* F. Gesäuse, Bdf., Kalbl.-Gatterl (M).

- Cr. flavipes a. signatifrons* Suffr. U. v. A., Gesäuse selten (K).
Cr. flavipes a. obscuripes Ws. O. Zeiring 1 St. (E).
Cr. bilineatus L. Wörschach, Bdf. (M). Auf Trockenwiesen an der Essling b. Admont n. selt. (Dr. Franz).
Cr. bilineatus a. bisbilineatus Pic. Wörschach, Selztal (M).
Cr. strigosus Germ. Kammern, Pürgg (Mitte August 1930) (M).
Cr. frontalis Marsh. Bdf. (M).
Cr. ocellatus Drap. Bdf., Selztal, Gams b. H. (M), Admont 2 St. (K) det. Dr. Franz.
Cr. labiatus L. Bdf., Kaiserau, Oppenberg (M).
Cr. labiatus a. diagrammus Suffr. Selztal (M).
Cr. vittula Suffr. Gams b. H. 3 St., davon 2 St. mit stark reduzierter gelber Zeichnung (M) det. Dr. Franz; Bdf. (M), Admont auf Trockenwiesen an der Essling selt. (Dr. Franz).
Cr. pusillus a. Marshami Ws. Bdf. auf Grauerle n. selt. (M).
Pachybrachys hieroglyphicus a. ictericus Ws. Selztal, Bdf. (M).
Pach. hieroglyphicus a. tristis Laich. Selztal, Wörschach (M).
Pach. haliciensis Mill. Selztal, Gesäuse, Gaishorn (M).
Lamprosoma concolor Sturm. St. Gallen, Gams b. H., Stainach (M).
Pachnephorus pilosus Rossi. Krumau b. A. (M), Wörschach (M).
Adoxus (Bromius) obscurus L. U. v. A. im Juni 2 St. (K), Bdf., Kaiserau (M).
Gastroidea polygoni L. Kraubath (M).
Timarcha metallica Laich. U. v. A. (Aigen) z. hfg., Kreuzkogel, Geierkogel, T. Geb., Landl 1 St. (K) det. Dr. Franz; O. Zeiring 4 St. (E).
Chrysomela lichenis v. ahena Germ. Hochalpin unter Steinen; Seck. Z., Hhd., E. Rst. (M), Bst., Zirbitzk., Stein a. M., Geierkogel, Himmeleck (K) einzeln; Sparafeld (M).
Chrys. rufa Duft. In der Waldregion n. selt. U. v. A., besonders in feuchten Gräben, Frauenberg b. A. z. hfg., Spitzenbachgr., Gesäuse, Gams b. H. (K), Oppenberg, Bdf., Kalblinggatterl (M).
Chrys. marcasitica Germ. Überall mit *rufa*, ebenso hfg. (K), Bdf., Gams b. H., Gaishorn (M), O. Zeiring 1 St. (E).
Chrys. crassimargo Germ. U. v. A., Gesäuse, Edelgraben bei Frauenberg weniger hfg. als die vorigen Arten, Geierkogel (K), Selztal, Pyhrnpass, Bdf., St. Gallen (M).
Chrys. crassimargo v. b. s. Ws. Grübl b. Eisenerz in 1800 m Höhe auf einer Schutthalde 2 St. sehr klein und dunkel gefärbt (K), det. Dr. Franz.

- Chrys. crassicollis* Suffr. U. v. A. selt. (K), Pyhrnpass, Gesäuse, Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Chrys. violacea* Müll. (*goettingensis* L.) U. v. A. hfg. (K), O. Zeiring 5 St. (E).
- Chrys. staphylea* L. Admont und Umgebung hfg. auf Wegen (K), Selztal auf sumpf. Wiesen (K), O. Zeiring 1 St. (E).
- Chrys. sanguinolenta* L. (nec auct.) Admont 1 St. (K) det. Dr. Franz; Oppenberg 1 St. (M).
- Chrys. marginata* L. Selztal 1 St. (K), Bdf., Oppenberg (M).
- Chrys. oricalcia a. lamina* F. U. v. A., besonders an der Aignerstraße, aber selt. (K), Bdf. (M).
- Chr. geminata* Payk. U. v. A. und Selztal auf Sumpfwiesen z. selt., Lorenzen i. P. (K), O. Zeiring 1 St. (E).
- Chrys. quadrigemina a. indigena* Ws. Scheifling i. Murtale (M).
- Chrys. hyperici* Forst. Selztal, Rottenmann (M).
- Chrys. cerealis* L. U. v. A. selt. (K.), Bdf., Selztal n. selt. (M), O. Zeiring 3 St. (E).
- Chrys. coerulans* Scriba. U. v. A. und Hall an feuchten, schattigen Stellen hfg. (K), Oppenberg (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- Chrys. coerulans a. subfastuosa* Motsch. Kreuzkogel im Juli 1 St. (K).
- Chrys. fastuosa* Scop. U. v. A. hfg. (K), Gesäuse (K).
- Chrys. menthastris* Suffr. Almsee (O. Oest.) (M).
- Chrys. varians* Schall. U. v. A. und Selztal auf Sumpfwiesen n. selt., Scheiplalm (K), Kalbinggatterl (M).
- Chrys. varians a. centaura* Herbst. Gesäuse, U. v. A., Edelgraben, Koderalm n. selt. (K).
- Chrys. varians a. pratensis* Ws. U. v. A. und Eßlingufer b. H. einzeln (K), Selztal (M).
- Chrys. polita* L. U. v. A., Gesäuse, Zirmitz b. Hall n. hfg. (K), Selztal, Bdf. (M).
- Chrysochloa intricata v. Anderschi* Duft. Subalpin: U. v. A. 1 St., Sulzkarhund (K), Selztal, Gesäuse, Hhd., Rott. T., Spital a. Pyhrn (M).
- Crysoch. gloriosa* F. E. Rst. (Grübl) 2 St. (K), Zeyr. K., Flitzenalm, Bdf. (M).
- Chrysoch. gloriosa a. virgo* Ws. U. v. A. und Grübl ob Eisenherz je 1 St. (K).
- Chrysoch. gloriosa a. nubila* Ws. Admont, Gesäuse, St. Lorenzen i. P., Heßhütte, Hohentauern je 1 St. (K), Kaiserau, Hhd., Geierkogel (M), O. Zeiring 4 St. (E).

- Chrysoch. gloriosa a. lugdunensis* Ws. (= *superba* Oliv). Admont am Licht Ende April 1 St. (K).
- Chrysoch. gloriosa a. (syn.) pretiosa* Suffr. Spitzbachgr. b. St. Gallen, U. v. A., Kreuzkogel selt. (K), Hhd. (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- Chrysoch. gloriosa a. venusta* Suffr. K. v. A. und Rößl b. Eisen-
erz je 1 St. (K.), O. Zeiring 5 dunkelblaue und 2 schwarz-
blaue Exemplare (E).
- Chrysoch. gloriosa a. atramentaria* Ws. [Hallstatt in Ob. Donau] (M).
- Chrysoch. bifrons* F. O. Zeiring 1 St. (E) det. Dr. Franz.
- Chrysoch. viridis* Duft. Sub- und hochalpin: Hohentauern und
Zeyr. K. je 1 St. (K), Seck. Z., Hhd. (M).
- Chrysoch. viridis a. ♀ mirifica* Ws. Tbt. (M).
- Chrysoch. melanocephala* Duft. Von 2000 m aufwärts auf Ur-
gestein: Bst., Hhd., Seckauer Alpen (K & M), Zirbitzk. auf
der Spitze 2 St., Hschw. bei 2330 m 1 St. (K) einzeln
unter Steinen; häufiger auf der Hhd.! (K).
- Chrysoch. virgulata* Germ. U. v. A., Geierkogel je 1 St. [Kor-
alpe über 1900 m 2 St.] (K).
- Chrysoch. virgulata a. seréna* Ws. E. Rst. 1 St. (M).
- Chrysoch. cacaliae* Schrank. Subalpin im ganzen Gebiete von
700—1900 m, oft s. hfg. (K & M).
- Chrysoch. cacaliae a. coeruleolineata* Duft. U. v. A. und T. Geb.
2 St., beide nur Übergänge zu dieser Form! (K), Oppen-
berg (M).
- Chrysoch. cacaliae trans. a. nubigena* Ws. Kematen, Heßhütte
je 1 St. (K).
- Ghrysoch. cacaliae v. macra* Ws. Veitlgraben, Kaiserau, Heß-
hütte je 1 St. (K).
- Chrysoch. speciosissima* Scop. Im ganzen Gebiet gemein bis
1800 m (M), Gesäuse, U. v. A., Kaiserau, Zirbitzk. (K).
- Chrysoch. speciosissima a. Letzneri* Ws. Kamleralm b. H., Stein
a. M. (K), Hschw. (M).
- Chrysoch. speciosissima a. viridescens* Letzn. (Suffr.) Hschw. (M),
Kamleralm b. H. 2 Ex. jedoch nur Übergänge zu dieser
Form (K).
- Chrysoch. speciosissima a. Schummeli* Ws. Selztal (M).
- Chrysoch. speciosissima a. violacea* Letzn. Hschw. 1 St. (K),
Riednersee (1800 m), Bst., Seck. Z. (M).
- Chrysoch. speciosissima a. fuscoaenea* Suffr. (Schummi.). Selztal,
T. Geb. (M).

- Chrysoc. speciosissima a. nigrescens* Letzn. Stein a. M., Hgr. je 1 St. (K).
- Chrysoc. frigida* Ws. Bst. 1 St. (K), Hgr., Seck. Z. (M).
- Chrysoc. frigida a. rhaetica* Ws. Himmelseck (b. Treglwang) 1 St. (K).
- Chrysoc. frigida a. cupreata* Ws. Hschw., Seck. Z. (M).
- Phytodecta viminalis* L. Gesäuse hfg., U. v. A., Spitzbachgraben (K).
- Phy. viminalis a. Gradli* Heyd. [Klaus i. O. Öst.] (M).
- Phy. viminalis a. 10-punctatus* L. Gesäuse, Ennsufer b. A. (K).
- Phy. viminalis a. Baaderi* Panz. U. v. A. und Gesäuse z. hfg. und Übergänge zu dieser Form. Spitzbachgr. (K), Paß Stein, Selztal (M).
- Phy. viminalis a. cinctus* Ws. U. v. A., Gesäuse, Spitzbachgr. z. hfg., Stein a. Mandl (Vorberge) (K).
- Phy. viminalis a. calcaratus* F. Gesäuse, Spitzbachgr. u. Stein a. Mandl (Vorberge) n. selt. (K), Selztal (M).
- Phy. Linnaeanus a. decastigma* Duft. Gesäuse z. selt. (K).
- Phy. Linnaeanus a. nigricollis* Westh. Gesäuse n. selt. (K), Paß Stein, Kainisch (M).
- Phy. Linnaeanus a. satanas* Westh. Gesäuse n. selt. (K), Paß Stein, Kainisch (M).
- Phy. 5-punctatus* F. Kematen (K), Strechen (M), O. Zeiring 5 St. (E).
- Phy. 5-punctatus a. unicolor* Ws. Gesäuse n. selt. (K), Selztal, Oppenberg, Paß Stein (M), O. Zeiring 3 St. (E).
- Phy. 5-punctatus a. flavicollis* Duft. Gesäuse selt. (K).
- Phy. 5-punctatus a. aucupariae* Jacobs. U. v. A., Mühlau, Gesäuse, Zirbitzk. einzeln (K).
- Phy. 5-punctatus a. padi* Penecke. Gesäuse (M).
- Phy. 5-punctatus a. obscurus* Grimmer. U. v. A. 1 St. (K), Flitzen (M).
- Ph. pallidus* L. U. v. A., Stein a. Mandl (Vorberge) selt. (K), Oppenberg (M).
- Phy. pallidus a. borealis* Ws. (Oliv.) U. v. A. 1 St. (K), O. Zeiring 2 St. (E).
- Phy. pallidus a. nigripennis* Ws. Gesäuse einzeln (K), Paß Stein (M).
- Phyllolecta vulgatissimus* L. Selztal (M).
- Phyll. tibialis a. Cornelii* Ws. U. v. A. z. hfg. (K).
- Phyll. vitellinae* L. U. v. A. hfg. (K), Strechen auf *Salix* s. hfg. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Phyll. vitellinae a. nigrinus* Motsch. Kainisch (M).
- Hydrothassa glabra* Hbst. U. v. A. und Krumauer Moor n. selt., Spitzbachgr. (K), Stoderz., Oppenberg (M).

- Hydr. marginella* L. Krumauer- und Aigner Moor selt. (K), Bdf., Selztal n. s. (M).
- Prasocuris phellandrii* L. U. v. A. (K), Bdf., Selztal (M).
- Pras. junci* Brahm, Selztal, Bdf. (M).
- Sclerophaedon carniolicus* Germ. U. v. A. n. selt., Sulzkarhund (K), Bdf., Gumpen, Tbt. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Scleroph. orbicularis* Suffr. Krumau b. A. (K), Selztal, Bdf., Hhd. (M).
- Phaedon segnis* Ws. Admonter Haus 1 St. (K).
- Ph. segnis a. obscurus* Ws. Selztal, Hhd., Zeyr. K., Tbt., St. Gallen (M).
- Ph. pyritosus* Rossi. Admont z. hfg. an Mauerwerk, Pleschalm, Sulzkarhund (K).
- Ph. laevigatus* Duft. U. v. A. und Edelgraben b. Frauenberg n. selt. (K), Bdf. (M).
- Ph. cochleariae* F. Selztal, Bdf. (M).
- Ph. armoraciae* L. U. v. A. 1 St. (K), Selztal, Bdf. (M).
- Melasoma aenea* L. U. v. A., Spitzbachgr., Gams b. H. n. hfg. (K), Bdf. (M).
- Mel. aenea a. cupraria* Ws. (= *vitellinea* Scop.) Selztal, Hgr., Flitzen, Gesäuse (M).
- Mel. aenea a. bicolor* Schils. (= *haemorrhoidalis* Müll.) Admont am Ennsufer 1 violettes Stück (K).
- Mel. 20-punctata* Scop. Selztal, Paß Stein selt. (M).
- Mel. populi* L. U. v. A. (K), Selztal, Oppenberg an Pappelschößlingen n. selt. (M), O. Zeiring 3 St. (E).
- Mel. tremulae* F. Bdf., Selztal (M).
- Mel. saliceti* Ws. Hall b. A. häufiger als *tremulae!* (K), Selztal, Bdf. (M).
- Phyllobrotica quadrimaculata* L. Selztal, Gaishorn (M).
- Luperus circumfusus* Marsh. Leoben (M).
- Lup. pinicola* Duft. Kaiserau, Bdf. (M).
- Lup. saxonicus* Gmel. Krumauer- u. Frauenberger Moor s. hfg. (K).
- Lup. longicornis* F. Gesäuse, Stein a. M. n. selt. (K), St. Gallen, Selztal (M).
- Lup. lyperus* Sulz. (*niger* Goeze). Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Lup. flavipes* L. U. v. A. n. selt. (K), Kaiserau, Pass Stein (M).
- Lup. viridipennis* Germ. Hhd., Flitzen, Hohentauern (M), [Koralpe b. 1800 m (K)].
- Lup. viridipennis a. Garieli* Aubé. (*varicollis*-Ws.) U. v. A., Geierkogel [Koralpe b. 1800 m] seltener als die Stammform (K).

- Lochmaea capreae* L. U. v. A. hfg., Stein a. M., Vorberge (K), O. Zeiring 1 St. (E).
- Loch. capreae v. luctuosa* Ws. U. v. A. einzeln unter der Stammform (K).
- Loch. crataegi* Forst. Bdf., Gesäuse (M).
- Pyrrhalta (Galerucella) viburni* Payk. U. v. A. z. hfg. (K), Bdf., Selztal (M).
- Galerucella lineola* F. U. v. A., besonders an der Enns z. hfg. (K), Bdf. (M).
- Gal. calmariensis* L. U. v. A. und Krumauer Moor z. hfg., Kreuzkogel (M).
- Gal. pusilla* Duft. Selztal (M).
- Gal. tenella* L. U. v. A. und Krumau (K), Bdf., Selztal (M).
- Galeruca tanaceti* L. U. v. A. und Kaiserau auf sumpfigen Wiesen hfg., Girn (K), Kalblinggatterl (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- G. pomonae* Scop. U. v. A. (K), Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- G. pomonae v. anthracina* Ws. U. v. A. (K).
- Sermylassa* Rtt. (*Sermyla*) *halensis* L. St. Martin an der Enns, Pürgg (M).
- Derocrepis rufipes* L. Wörschach, Aussee, Gams b. H. im Kalkgebiet (M).
- Crepidodera Peirolerii* Kutsch. Scheiplalm 4. Juli 1939 (M).
- Crep. femorata* Gyll. Krumauer Moor n. selt. (K), Selztal, Flitzenalm (M).
- [*Crep. norica* Ws. Koralpe] (M).
- Crep. melanostoma* Redtb. Auf Kalk sub- und hochalpin: Spitzbachgr., Rößl, Natterriegel (K), Kaiserau, T. Geb., Stoder Z., Zeyr. K., E. Rst., Voralpe, Windischgarsten (M).
- Crep. cyanescens* Duft. Reiteralm (K), Flitzenalm, Stoder Z., Hauser Kaibling, Hhd., Bst., Seck. Z., Kaiserau auf *Aconitum napellus* (M).
- Crep. simplicipes* Kutsch. Hochalpin unter Steinen: Hhd., Seck. Z., Zirbitzk. (M) rev. Dr. Franz.
- Crep. transversa* Marsh. Bdf., Gams b. H. (M).
- Crep. ferruginea* Scop. U. v. A. (K), Oppenberg, Bdf. (M).
- Ochrosis ventralis* Illig. Bdf. (M).
- Lythraria salicariae* Payk. Bdf., Selztal (M).
- Epithrix atropae* Foudr. Selztal, Bdf. (M).
- Ep. atropae a. nigritula* Ws. Bdf. (M).
- Ep. atropae a. 4-maculata* Ws. Bdf. (M).
- Chalcoides nitidula* L. Bdf. (M).

- Chalc. aurea* Geoffr. Aigen b. A. (K), Bdf. (M).
Chalc. fulvicornis F. Aigen und Krumau b. A. n. selt. (K), Bdf., Wörschach (M).
Chalc. aurata Marsh. Admont und Umgebung hfg., Heindlkar im Gesäuse (K), Stoder Z. (M).
Hippuriphila Modeeri L. U. v. A., Krumauer Moor (K), Bdf. (M).
Hipp. prescutellaris Pic. Bdf. (M).
Minota obesa Waltl. Admont, Selztal, Oppenberg, Bdf., Bst., Sengs. G. (M).
Mantura obtusata Gyll. Selztal, Bdf., Oppenberg, Wörschach (M).
Mant. rustica L. Selztal, Bdf. (M).
Chaetocnema semicoerulea Koch Selztal, Bdf. (M).
Chaet. semicoerulea a. *saliceti* Ws. U. v. A. (K).
Chaet. concinna Marsh. Bdf., Wörschach (M).
Chaet. angustula Rosh. Triebenstein (M).
Chaet. angustula a. *alpicola* Ws. Griesk. (M).
Chaet. Sahibergi a. *cyanescens* Ws. Bdf., Liezen (M).
Chaet. hortensis Geoffr. Bdf., Liezen, Aussee (M).
Psylliodes cucullata Illig. Bdf., Oppenberg (M).
Psyll. glabra Duft. Bdf., Selztal, E. Rst. (M).
Psyll. chrysocephala L. Bdf. (M).
Psyll. napi F. Bdf., Liezen, Kaiserau (M).
Psyll. picipes Redtb. Kaiserau, Gesäuse (M).
Psyll. cuprea Koch Pürgg (M).
Psyll. instabilis Foudr. Kraubath, Wörschach, Kaiserau (M).
Psyll. affinis Payk. Selztal, Bdf., Stainach (M).
Psyll. dulcamarae Koch Bdf.. Selztal (M).
Psyll. chalcomera Illig (früher a. von *hyoscyami* L.) Selztal (M).
Psyll. picina Marsh. U. v. A. und Hall (K), Bdf., Wörschach (M).
Haltica oleracea L. Krumauer und Aigner Moor n. selt. (K).
Haltica pusilla Duft. U. v. A. n. selt., Stein a. M. (K), Bdf., T. Geb., Stoder Z. (M).
Hermaeophaga mercurialis F. U. v. A., Heindlkar (K), Pürgg, Gams b. H. auf Kalkboden an *Mercurialis* (M).
Batophila rubi Payk. U. v. A. (K) überall gemein (M).
Phylloreta exclamationis Thunbg. Selztal, Gesäuse (M).
Phyll. tetrastigma Com. Bdf., Selztal, Kalblinggatterl (M).
Phyll. flexuosa Illig. Bdf. (M).
Phyll. flexuosa a. *fenestrata* Ws. Selztal, Oppenberg (M).
Phyll. vittata Fab. Admont 1 St. (K) det. Dr. Franz, Bdf., Triebenstein (M).

- Phyll. undulata* Kutsch. Selztal, Bdf., Hhd. (M).
Phyll. vittula Redtb. Bdf. (M).
Phyll. nemorum L. Selztal, Bdf., gemein in Gärten (M).
Phyll. atra F. Bdf., Gesäuse, Hhd. (M).
Phyll. nigripes F. Bdf. n. selt., Liezen, Bst., Hschwg. (M).
Aphthona cyparissiae Koch Gams b. H. (M).
Aph. pallida Bach. Bdf. auf *Geranium pratense* (M).
Aph. lutescens Gyll. Selztal (M).
Aph. venustula Kutsch. Selztal, Aussee, Windischgarsten, Kraubath (M).
Aph. pygmaea Kutsch. Gesäuse, Liezen (M).
Aph. euphorbiae Schrank. Aich, Selztal, Bdf. (M).
Aph. ovata Foudr. St. Gallen, Tbt. (M).
Longitarsus anchusae Payk. Selztal, Bdf. (M).
Long. oblitteratus Rosh. Bdf., Selztal (M).
Long. niger Koch Selztal (M).
Long. nigerrimus Gyllh. Bdf. (M).
Long. parvulus Payk. Bdf., Liezen (M).
Long. holsaticus L. Bdf., Selztal auf *Pedicularis* im Moor (M).
Long. apicalis Beck. Selztal, Bdf. (M).
Long. brunneus Duft. Liezen, Oppenberg, Arling, Flitzenalm; die gemeinsten Art der Gattung (M).
Long. rubellus Foudr. Subalpin hfg. im ganzen Gebiete. Kaiserau, Bdf., Hhd. an Pestwurz (M).
Long. fulgens Foudr. Selztal, Bdf., Liezen (M).
Long. luridus Scop. Bdf., Selztal gemein (M).
Long. nasturtii F. Bdf. (M).
Long. suturalis Marsh. Bdf., Selztal (M).
Long. suturellus Duft. Aigen b. A. (K), Oppenberg, Bst., Kalblinggatterl (M).
Long. gracilis Kutsch. Bd. (M).
Long. curtus All. Bdf. (M).
Long. melanocephalus Deg. Bdf., Selztal (M).
Long. longipennis Kutsch. Selztal, Bdf. (M) det. Dr. Franz.
Long. nigrofasciatus Goeze. Bdf. (M).
Long. tabidus F. Selztal, Bdf. (M).
Long. pratensis Panz. Bdf. (M).
Long. rubiginosus Foudr. Leoben (M).
Long. pellucidus Foudr. Bdf. (M).
Long. succineus Foudr. Selztal, Bdf. (M).
Long. symphyti Hktgr. Bdf. (M).

- Dibolia Försteri* Bach. Gesäuse (M).
Dib. depressiuscula Letzn. Wörschach, Bdf., St. Michael (M).
Dib. rugulosa Redtb. Bdf. (M).
Dib. cryptocephala Koch Kraubath (M).
Apteropeda orbiculata a. *aurichalcea* Ws. Gams b. H. (M).
Mniophila muscorum Koch Selztal. Bdf. (M).
Sphaeroderma testaceum F. Hall b. A. (K), Selztal, Bdf., Stainach, Kaiserau (M).
Sph. rubidum Graëlls. Bdf., Stainach (M).
Hispella atra L. Am Mitterberg bei Selztal n. selt., Bdf., Steinach (M).
Cassida viridis L. U. v. A. und Krumauer Moor z. hfg., Gesäuse (K).
Cass. hemisphaerica Herbst. Selztal, Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
Cass. margaritacea Schall. Bdf., Selztal n. selt. (M).
Cass. murraea L. Lainbach (M).
Cass. denticollis Suffr. U. v. A. (K), Bdf., Steyrersee (M), O. Zeiring 1 St. (E).
Cass. sanguinolenta Müll. U. v. A. 1 St. (K).
Cass. sanguinosa Suffr. Windischgarsten (M), O. Zeiring 1 St. (E).
Cass. rubiginosa Müll. U. v. A. z. selt. (K), Hgr. (K), Bdf., Kalblingatterl (M).
Cass. Panzeri Ws. Selztal (M).
Cass. vibex L. U. v. A. selt. (K), Bdf. (M).
Cass. nebulosa L. U. v. A. 1 St. (K), auf *Chenopodium agreste* hfg. (M).
Cass. flaveola Thunb. Bdf., Selztal (M).
Cass. nobilis L. Selztal hfg. Gesäuse, Singsdorfer Alm (Hhd) (M).

Lariidae.

- Bruchus (Laria) pisorum* L. Kaiserau 1 St. (M).
Bruchus (Laria) atomarius L. U. v. a. (K), Gesäuse (K & M), Selztal, Bdf. (M).
Bruchus (Laria) rufipes Hbst. (= *nubilus* Boh.) Bdf. (M).
Bruchidius marginalis F. Bdf., Wörschach (M).
Bruchidius pauper Boh. Mautern (M).
Bruchidius fasciatus Ol. (*cisti* Payk) Leoben (M).

Anthribidae.

- Platyrrhinus resinosus* Scop. U. v. A. selt. im Mai (K), Aich, Bdf. hinter der Rinde von Erlenstöcken (M).

- Rhaphitropis (Tropideres) marchicus* Hbst. Bdf., Kaiserau an
dürren Weiden hfg. (M).
Dissoleucas (Tropideres) niveirostris F. Bdf. (M).
Tropideres sepicola F. Bdf. an dürren Haseln u. Eichenzweigen (M).
Tropideres undulatus Panz. Bdf. (M).
Anthribus (Platystomus) albinus L. Admont (K), Bdf., Selztal (M).
Brachytarsus nebulosus Forst. (*Anthribus variegatus* Geoffr.)
Aigner Moor (K), gemein auf Nadelhölzern: Bdf., Kaiserau,
Selztal (M).
Choragus Sheppardi Kirby. Bdf. (M).

Curculionidae.

- Otiorrhynchus mastix* Ol. Vereinzelt in Selztal, Bdf., Arling,
Mautern (M), O. Zeiring 1 St. (E).
Ot. inflatus a. salebrosus Boh. Selztal, Oppenberg, Strechen,
Sunk, Bdf., Pyhrnpass (M).
Ot. geniculatus Germ. U. v. A., Gesäuse, Kematen, Kaiserau
z. selt. (K), Bdf., Oppenberg (M) det. Dr. Franz.
Ot. pulverulentus Germ. Subalpin: Gesäuse (K), n. selt. T. Geb.,
Arling; im Sunk auf *Rumex* (M).
Ot. obsoletus Stierl. T. Geb. (M).
Ot. sensitivus Scop. U. v. A., Kamleralm, Kematen, Heindlkar,
Gesäuse hfg. (K), Bdf. (M).
Ot. armadillo Rossi. Im Kalkgebiet gemein, sonst selt. U. v. A.,
Kematen, Kaiserau [K], Bdf. (M).
Ot. bisulcatus F. Landl, U. v. A., Heindlkar hfg. (K), O. Zei-
ring 3 St. (E).
Ot. niger F. Hochalpin unter Steinen: Zirbitzk., Gesäuse, U. v. A.,
Natterriegel. (In der Krummholzregion), [Koralpe bei 1900 m]
(K), Hochalpin unter Steinen: Hhd., Seck. Z. (M).
Ot. niger a. villosopunctatus Gyll. Subalpin auf Nadelhölzern:
Admonterhaus (K), Scheiplalm (M).
Ot. niger a. montanus Boh. [Koralpe bei 1400 m (K)] Seck. Al-
pen (M).
Ot. fuscipes Ol. Zirbitzk., Natterriegel z. selt. unter Steinen (K).
T. Geb., Flitzen auf Fichten (M).
Ot. morio F. samt Abarten sub- und hochalpin: Flitzenalm, Sengs.
G. (M), Seck. Alpen (Griesk.), Zeyritz., T. Geb., Admonter-
haus, Tbt. hfg. unter Steinen (K).
Ot. morio v. ebenius Gyllh. Admonterhaus, Landl (K)

- Ot. morio v. memnonius* Gyllh. Natterriegel und Admonterhaus, Zeyr. K. (K), Tbt. (M).
- Ot. raukus* F. Selztal, Bdf. (M).
- Ot. perdix* Oliv. U. v. A., Gesäuse hfg. (K), Strechau, Pürgg, Paß Stein nur im Kalkgebiet. Auf Nadelholz; auch auf Sauerdorn (M).
- Ot. chalceus* Stierl. Nur auf Kalk, hochalpin. Leobner, E. Rst., Sparafeld, Zeyr. K. (K), Sengs., G. Dachstein (M).
- Ot. pigrans* Stierl. Sub- und hochalpin unter Steinen: Kalblinggatterl, Selztal, T. Geb., Kaiserau, Tbt., Zeyr. K., E. Rst., Voralpe, Klaus (O. Österr.) (M).
- Ot. costipennis* Rosh. Hochalpin: Sparafeld, Zinödl, T. Geb. (M).
- Ot. scaber* L. U. v. A., Krumau (K); s. hfg. an Fichten: Bdf., T. Geb. (M).
- Ot. subcostatus* Stierl. T. Geb. 1 St. (M).
- Ot. uncinatus* Germ. [Koralpe (leg. Zoppa)] Selztal, Gesäuse (M).
- Ot. globulus* Gredl. Gumpen 2 St. (det. Form.) (M).
- Ot. porcatus* Herbst. Admont und Umgebung z. selt. (K), Bdf., Voralpe (M).
- Ot. dubius* Ström. E. Rst., Hgr., Zeyr. K., Zirbitzk. n. selt. (K).
- Ot. dubius a. comosellus* Boh. Hochalpin im ganzen Gebiet (M). Reiteralm, (Hschw.) Hhd. (K).
- Ot. dubius a. pauper* Boh. Hochalpin im ganzen Gebiet. Scheipl-alm, Zirbitzk. [Koralpe] (M).
- Ot. singularis* L. Stein a. M., Gesäuse, U. v. A. hfg. (K).
- Ot. singularis a. Chevrolati* Gyll. Selztal (M).
- Ot. frigidus* Muls. Subalpin auf Fichten hfg. Bdf., Hhd. (M).
- Ot. subdentatus* Bach, Kaiserau, Hhd. (M).
- Ot. austriacus* F. U. v. A. (K), Bdf., Oppenberg n. selt. (M).
- Ot. anthracinus* Scop. Bdf. auf Disteln Ende Juni; mehrmals auch auf einem sonnigen Wiesenhang von hohen Kräutern gestreift (M).
- Ot. gemmatus* Scop. Vom Tale bis ins Hochgebirge gemein, U. v. A. hfg., Tbt., Gams b. H., Hohentauern zur Scheipl-alm (K), Kreuzkogel. Gesäuse auf Erlen (K), O. Zeiring 2 St. (E).
- Ot. auricapitlus* Germ. Sub- und hochalpin unter Steinen im ganzen Gebiet n. selt., Kaiserau, Tbt., Zinödl, Himmeleck, T. Geb., [Koralpe] (K), Seck. Z., Gumpeneck, Voralpe (M).
- Ot. alpicola* Boh. Gumpeneck (M), Kalblinggatterl 1 St. (Dr. Franz).

- Ot. squamosus* Miller. U. v. A., Natterriegel, Spitzenbachgr., T. Geb. (auf Zwergerlen) n. selt. (K), Prebichl, Hhd. (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- Ot. salicis* Ström. Auf Gesträuch in Berg und Tal hfg. (M). U. v. A., Admonterhaus in der Krummholzregion (K).
- Ot. auricomus* Germ. Gesäuse, T. Geb. (K), Sunk (M) det. Dr. Franz.
- Ot. pinastri* Herbst. Selztal, Oppenberg, Bdf., Paß Stein (M).
- Ot. chrysocomus* Germ. Subalpin auf Fichten und Grünerlen n. selt. im ganzen Gebiet: Geierkogelalm, E. Rst., Zeyr. K., T. Geb., Stein a. M. (K), Stoderz. (M).
- Ot. ligustici* L. U. v. A., Hall b. A. (K), Oppenberg (M).
- Ot. pauxillus* Rosh. Selztal, Bdf., Oppenberg, Bst. an Fichtenreisig (M).
- Ot. ovatus* L. U. v. A., Gams b. H. (K), Oppenberg (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Ot. Megerlei* F. Besonders auf Kalk n. selt. an *Caltha palustris* in schattigen Wältern; in den Zentralalpen nur hochalpin unter Steinen: [Koralpe b. 1600 m], Zeyr. K., T. Geb. (K), Admont, Gesäuse, Pyhrnpass, Gumpen, Hgr., Schüttkogel (M).
- Peritelus hirticornis* Herbst. Bdf., Oppenberg (M).
- Phyllobius calcaratus* F. (= *glaucus* Scop.) U. v. A. hfg. (K).
- Phyll. calcaratus* a. *piri* F. (= *atrovirens* Gyllh.) U. v. A. und Gesäuse hfg. (K).
- Phyll. calcaratus* a. *densatus* Schilsky. Selztal (M).
- Phyll. calcaratus* a. *pseudodensatus* Reitt. Krumauer Moor (K), Oppenberg (M).
- Phyll. urticae* De Geer. Selztal auf Sumpfwiesen (K).
- Phyll. urticae* a. *caesius* Steph. Selztal (M).
- Phyll. piri* L. Aigner- und Krumauer Moor s. hfg. (K).
- Phyll. alpinus* Stierl. Sub und hochalpin im Grase hfg.: Stein a. M. (K), Kaiserau, Flitzenalm, Grsk., Hhd. (M).
- Phyll. alpinus* a. *sudeticus* Reitt. Seck. Alpen (Hocheckalm), Stein a. M. n. selt. (K), Grsk., Bdf., Wald (M).
- Phyll. argentatus* L. Aigen b. A. selt. (K).
- Phyll. a. viridianus* Boh. (= *viridans*) Aigen b. A. (K). Selztal, Liezen, Bdf., Aussee (M).
- Phyll. maculicornis* Germ. U. v. A. n. selt. (K), Oppenberg, Sunk (M).
- Phyll. arborator* Hbst. (= *psittacinus* Germ.) U. v. A., Gams

b. H., Landl, Gesäuse, Tbt., Natterriegel n. selt. (K), Hhd. (M), O. Zeiring 2 St. (E).

Phyll. oblongus L. U. v. A., Krumauer Moor z. hfg. (K).

Phyll. viridicollis F. U. v. A. n. selt., Geierkogel (K), O. Zeiring 1 St. (E)

Polydrosus impar Goz. Liezen, Gesäuse (M).

Pol. atomarius Oliv. U. v. A., Kamleralm ob Hall, St. Lorenzen i. P. (K).

Pol. paradoxus Stierl. Triebenstein, Sunk, Kalblinggatterl, Spfd., Gesäuse auf *Salix* (M).

Pol. amoenus Germ. Sub- und hochalpin z. hfg.: Stein a. M. (K), Grsk., Hhd., Hohentauern (M).

Pol. amoenus a. *Hopfgarteni* Stierl. Hohentauern (M).

Pol. mollis Stroem. Gesäuse, U. v. A. n. selt. (K).

Pol. mollis a. *cupreus* Schils. Wörschach (M).

Pol. sericeus Schall. Gesäuse, Natterriegel (K), Wald (M) hfg., O. Zeiring 1 St. (E).

Pol. impressifrons Gyllh. Admont (K), Kaiserau, Selztal, Bdf. n. selt. (M).

Pol. cervinus L. Kaiserau (K), Wörschach (M).

Pol. pilosus Gredler. U. v. A. (K), Bdf., Oppenberg (M).

Pol. undatus F. (*tereticollis* Bonsd.) Stein a. M., Seck. Alpen (Hocheggalm) (K & M), Kaiserau, Gesäuse, Gams b. H. n. selt. (K).

Pol. ruficornis Bonsd. Geierkogel (K), Selztal, Bdf. auf Grünerlen (M).

Pol. pterygomalis Boh. Gams b. H. (K).

Sciaphilus asperatus Bonsd. U. v. A. n. selt. (K), Kaiserau (M).

Brachysomus echinatus Bonsd. Wörschach (M).

Rhinomias (Omnias) forticornis Boh. Selztal, Wald, Bdf. aus Moos; Tbt. (M).

Strophosomus melanogrammus Först. U. v. A. (K), Kalblinggatterl hfg. (M).

Brachyderes incanus L. Leoben auf Föhren (M).

Sitona tibialis Herbst. U. v. A. (K), Bdf., Wald (M).

Sit. lineatus L. Bdf., Selztal (M), O. Zeiring 1 St. (E).

Sit. suturalis Steph. Selztal, Bdf., Liezen (M).

Sit. sulcifrons Thunb. Umgeb. v. A. (Krumauer Moor) n. selt., Selztal, Bdf. hfg. (M).

Sit. puncticollis Steph. Selztal, Bdf., Gams b. H. (M).

Sit. flavescens Marsh. Krumau b. A., Hall b. A. (K), Bdf. hfg. (M).

- Sit. hispidulus* F. Admont (K), Bdf., Oppenberg (M).
Sit. humeralis Steph. Selztal, Bdf. (M).
Sit. inops Gyll. Styria 1 St. (leg. Strobl).
Trachyphloeus laticollis Boh. Wörschach (M).
Tr. bifoveolatus Beck. Bdf., Mautern (M).
Tr. aristatus Gyll. Bdf., Selztal, Wörschach (M).
Liophloeus tessulatus Müller. U. v. A., Hall b. A. (K), Oppenberg (M).
L. Herbsti v. Schmidti Boh. U. v. A., Hall b. A., Gams b. H. hfg. (K), Oppenberg, Wald (M).
Barynotus obscurus F. Aigen und Hall b. A. (K), Selztal, Ge- säuse, Bdf. (M).
Bar. moerens F. U. v. A. (K), Wörschachwald an *Mercurialis* (M).
Chlorophanus viridis L. (Stammform) Kraubath (M).
Chl. viridis a. salicicola Germ. U. v. A. (Krumau) auf sumpfigen Wiesen an Weiden n. selt., Hall b. A. (K).
Tanymecus palliatus F. Krumau b. A. (K).
Lepyrus palustris Scop. U. v. A. n. selt. (K), Selztal (M).
Lep. capucinus Schall. Ennsufer b. A., Gams b. H. (K).
Lep. armatus Ws. U. v. A. (K), Selztal, Oppenberg, Bdf. an Grauerle (M).
Leucosomus pedestris Poda. Styria 1 St. (leg. Strobl).
Adosomus roridus Pall. O. Zeiring 1 St. (E).
Cleonus piger Scop. Ennsufer b. A. (K), Bdf. (M).
Larinus brevis Herbst. Bdf., Stainach, Kalblinggatterl (M).
Lar. sturnus Schall. Aigen b. A. (K), Gaishorn, Stainach (M).
Lar. planus F. U. v. A. z. hfg. (K), Bdf. (M).
Lar. jaceae F. U. v. A. (K), Flitzenalm, Wörschach, Bdf. (M).
Tropiphorus tomentosus Marsh. Hocheggalm (Seckauer Alpen) (K), Kalbinggatterl, Bdf., Oppenberg (M).
Trop. carinatus Müll. U. v. A. und Hall b. A. (K), Oppenberg, T. Geb., Bdf. (M).
Trop. globatus Herbst. Kaiserau, Gumpen (M).
Trop. styriacus Bed. Sub- und hochalpin: Flitzen, Tbt., Voralpe, Kaiserau, Hhd. (M), Sulzkarhund, Admonterhaus (K).
Trop. cucullatus Fauv. Flitzenalm, Kaiserau, mehrfach gekätschert (M).
Dichotrachelus Krausi Pencke. Hochalpin unter Steinen: Hochmölbing, Spfd., Zeyritz. (M).
Alophus triguttatus v. vau Schrank. U. v. A., Hall b. A. (K), Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).

- Al. triguttatus v. uniformis* Reitt. Admont (K).
Al. austriacus Otto. Strechen (M).
Hylobius piceus De Geer. U. v. A., Gesäuse, Gams b. H. n. selt. (K), Oppenberg (M), O. Zeiring 3 St. (E).
Hyl. abietis L. U. v. A. und im Moor z. hfg. (K), O. Zeiring 1 St. (E).
Hyl. transversovittatus Goeze (= *fatuus* Rossi). U. v. A. hfg., Landl (K), Selztal, Öblarn (M).
Liparus glabrirostris Küst. U. v. A. n. selt. (K), Oppenberg, Flitzen (M).
Lip. germanus Admont und Umgebung auf Wegen und an Mauern auf Pestwurz überall hfg. (K), Kaiserau, Landl, Trieben, Sulzkarhund, T. Geb. (K), O. Zeiring 1 St. (E).
Plinthus Sturmii Germ. Subalpin: Geierkogel, T. Geb. (K), Kaiserau, Oppenberg, Schüttkogel, Tbt., Stein a. M. (M).
Pl. Findeli Boh. Vom Tale bis zur Waldgrenze: Hochgrößen, Hschw., Sulzkarhund, Krumau b. A. (K), Tbt., Oppenberg (M).
Liosoma deflexum Panz. Selztal, Bdf., Gaishorn (M).
L. cribrum Gyll. Kaiserau, Selztal, Bdf., Tbt. (M).
L. cyanopterum Redt. 1 St. im Walde bei Großreifling, Gams b. H., Zirbitzk. (3 St. hochalpin) (M), Hartelsgraben bei Hieflau an *Valeriana*-Arten (Dr. Franz).
Trachodes hispidus L. Selztal n. selt., Scheiplalm (M).
Cotaster uncipes Boh. Selztal, Gesäuse (M).
Hypera oxalidis Herbst. U. v. A. n. selt. (K).
Hyp. oxalidis v. ovalis Boh. Selztal (M).
Hyp. intermedia Boh. U. v. A., Eisenerz (K), Selztal, Bst., Tbt. (M).
Hyp. palumbaria Germ. Kaiserau (M).
Hyp. comata Boh. Aigen b. A. (an der Enns) n. selt. (K), Selztal, Gesäuse (M).
Hyp. rubi Krauß. Bdf., Hhd., Wald, Voralpe (M).
Phytononius zoilus Scop. (= *punctatus* F.) U. v. A. auf Wegen z. hfg., Gams b. H. (K), O. Zeiring 1 St. (E).
Phyt. adspersus a. ignotus Boh. Selztal (M).
Phyt. rumicis L. Bdf., Pyhrnpaß (M).
Phyt. nigrirostris F. Selztal, Tbt. (M).
Phyt. arator L. Liezen, Bdf. (M).
Phyt. pedestris Payk. U. v. A. und im Krumauermoor n. selt. (K), Bdf. (M).
Phyt. elongatus Payk. Aigen b. A., Gesäuse, Gams b. H., Hohen-tauern n. selt. (K), Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
Phyt. plantaginis De Geer. Selztal, Wald, Tbt. (M).

- Phyt. variabilis* Herbst. Pürgg, Bdf. (M).
- Phyt. trilineatus* Marsh. Selztal, Bdf. (M).
- Pissodes piceae* Ill. U. v. A. hfg., darunter 2 sehr kleine Stücke mit gleich breiter Binde (K) nach Dr. Franz noch Stammform!
- Piss. notatus* F. U. v. A. (K), Selztal (M).
- Piss. pini* L. U. v. A., Spitzenbachgr. einzeln (K), Seck. Z., Bdf. (M).
- Piss. validirostris* Gyll. Aigen b. A. (K), Selztal, Sengsengeb. (M).
- Piss. scabricollis* Mill. Stein a. M. bei 1500 m, Kaiserau auf Fichten, Globukenalp (M).
- Piss. harcyniae* Herbst. Bdf., Gesäuse, Kaiserau (M).
- Piss. piniphilus* Herbst. Bdf. (M).
- Grypus* Germ. (= *Grypidius equiseti*) F. U. v. A. (Ennsufer) n. selt. (K). Auch an Schachtelhalmen im Moor bei Bdf. n. selt. (M).
- Notaris acridulus v. montanus* Faust. U. v. A., Kaiserau, Zirbitzk. n. selt. (K), Kaiserau, Bdf., Hhd. n. selt. (M).
- Dorytomus longimanus* Forst. Selztal (M).
- Dor. tremulae* Payk. Admont (K), Bdf. (M).
- Dor. tortrix* L. Krumauer Moor (K), Bdf. auf Espen (M).
- Dor. hirtipennis* Bed. Selztal (M).
- Dor. flavipes* Panz. Bdf., Selztal, Gams b. H. (M).
- Dor. Dejeani* Faust. Bdf. (M).
- Dor. taeniatus* F. Stainach, Selztal, Bdf., Flitzen (M).
- Dor. occalescens* Gyll. Bdf. (M).
- Dor. melanophthalmus* Payk. U. v. A. z. selt. (K), Bdf. (M).
- Dor. melanoph. a. clitellarius* Boh. Selztal (M).
- Dor. rufulatus* Bed. (= *rufulus* Bed.) Bdf., Admont (M).
- Smicronyx jungermanniae* Reich. Selztal, Bdf. (M).
- Bagous lutulentus* Gyll. (= *nigritarsis* Thoms.) Selztal, Bdf. (M).
- Orthochaetes setiger* Beck. Bdf., Stainach (M).
- Trachysoma* (= *Orthochaetes*) *alpinum* Pen. Hochalpin; E. Rst. unter Steinen (M), Kalbling am Schneehang unter Steinen 3 St. (Dr. Franz).
- Cassonus parallelepipedus* Herbst. U. v. A. (K).
- Eremotes ater* L. U. v. A. und Hall hfg. (K), Hhd., Gumpen (M).
- Cryptorrhynchidius* (= *Cryptorrhynchus*) *lapathi* L. U. v. A. n. selt. (K), Hhd. an Erlen hfg. (M).
- Acalles camelus* F. Bdf., Selztal, Gesäuse (M).
- Ac. roboris* Curtis Bdf., Stainach (M).
- Ac. pyrenaeus* Boh. Bdf., Kaiserau, Sattental (M).

- Ac. turbatus* Boh. (früher var. von *ptinoides* Marsh.) Gesäuse (M).
Echinodera (Acalles) hypocrita Boh. Bdf., Kaiserau, Stainach an düri en Haseln (M).
Coeliodes quercus F. (= *dryados* Gmel.) Bdf. und Selztal an Eichen (M).
Coel. trifasciatus Bach. Bd. hfg. (M).
Coel. rubicundus Herbst. Bdf., Selztal an Birken (M).
Coel. rubic. a. nigritarsis Hartm. 1 St. im Aigner Moor von Leg- föhren geklopft (K).
Auleutes (= Craponius) epilobii Payk. Bdf., Gaishorn (M).
Cidnorrhinus 4-maculatus L. U. v. A. und Krumau (K). Auf den großen Brennesseln gemein: Oppenbergl (M).
Zacladus (= Allodactylus) affinis Payk. U. v. A. (K), Selztal, Gams b. H, Flitzen an *Geranium sylvaticum* (M).
Scleropterus offensus Boh. Bdf., Gesäuse, Gumpen, Kaiserau, St. Gallen (M), Hartlesgraben b. Hieflau (Dr. Franz).
Rhytidosomus fallax Otto. Bdf., Hohentauern, Gesäuse, Flitzen- alm (M).
Brachiodontus alpinus Hampe. Hochalpin im Krummholz: Hhd., Kalbinggatterl, Zeyr. K. (M), Kalbling und Leobner hoch- alpin an Schneerändern (Dr. Franz).
Rhinoncus castor F. Bdf., Selztal, Oppenberg (M), Moorwirt- schaft b. A. selt. (Dr. Franz).
Rhin. bruchoides Herbst. Selztal, Bdf. hfg. (M), Admont hfg. an Teichen, in der Moorwirtschaft und bei Frauenberg an *Polygonum persicaria* (Dr. Franz).
Rhin. albicinctus Gyll. Krumau b. A. (Scheiblteich auf *Poly- gonium amphibium* hfg.) (Dr. Franz).
Rhin. pericarpialis L. U. v. A. (K), Oppenberg an *Rumex* ge- mein (M).
Rhin. perpendicularis Reich. Selztal, Bdf. (M), Krumau b. A. (Scheiblteich) einzeln (Dr. Franz).
Phytobius velaris Gyll. Selztal (M), am Ennsufer b. A. n. selt. (Dr. Franz).
Phyt. comari Hbst. Selztal, Bdf. (M).
Phyt. 4-tuberculatus F. Bdf. (M), Krumau b. A. (Scheiblteich) auf *Polygonum*-Arten n. selt. (Dr. Franz).
Heterophytobius (Phyt.) granatus Gyll. Selztal, Bdf. (M), Enns- ufer b. A. hfg. (Dr. Franz).
Litodactylus (Phyt.) leucogaster Marsh. Windischgarsten an *My- riophyllum* (M).

- Ceutorrhynchidius horridus* Panz. Bdf. auf Disteln; noch in 900 m Höhe (M).
- Ceuth. troglodytes* F. Gesäuse (K), Selztal (M).
- Ceuth. Barnevillei* Gren. Bdf. (M) (rev. Dr. Franz), Kammern (M), Moorwirtschaft u. Kordonwiese b. A. je 1 St. (Dr. Franz).
- Micrelus ericae* Gyll. Bdf., Kaiserau, Scheiplalm (M), Admont in den Mooren auf *Calluna vulgaris* n. selt. (Dr. Franz).
- Mic. ericae a. Olcesei* Pic. Bdf. (M), Kaiserau im Frühjahre. Vielleicht nur unausgefärbte Stücke! (M).
- Ceutorrhynchus terminatus* Herbst. Bdf. (M).
- Ceuth. nigrinus* Marsh. Bdf., Gaishorn, Kammern (M).
- Ceuth. floralis* Payk. Bdf. auf Kreuzblütlern gemein (M).
- Ceuth. pyrrhorhynchus* Marsh. Bdf., Kammern (M).
- Ceuth. vilis* Gyll. Flitzenboden (M). Auf *Betonica Jacquinii* sehr lokal (Dr. Franz) det. H. Wagner.
- Ceuth. signatus* Gyll. Mautern (M).
- Ceuth. abbreviatulus* F. Admont, Selztal, Bdf. an *Symphytum officinale* (M).
- Ceuth. geographicus* Goeze. Rottenmann (M), Bdf. an *Echium vulgare* n. selt. (Dr. Franz).
- Ceuth. T-album* Gyll. Bdf., Pyhrnpaß, Flitzen, Wörschach auf *Anchusa* (M) det. H. Wagner.
- Ceuth. Javeti* Bris. Bdf. auf *Anchusa* (M) det. Dr. Franz.
- Ceuth. angulicollis* Schultze. Bdf. (M) det. Hubenthal, Veitlgraben b. A. und Hartelsgraben (Gesäuse), selt. an *Myosotis palustris* nicht unter 900 m (Dr. Franz).
- Ceuth. larvatus* Schultze. Bdf. 3. Mai 1931 an *Pulmonaria officinalis* (M).
- Ceuth. litura* F. Bdf. (M).
- Ceuth. trimaculatus* F. Bdf. an Disteln 23. Juni 1929 (M).
- Ceuth. asperifoliarum* Gyll. Bdf., Oppenberg (M).
- Ceuth. pallidicornis* Bris. Pyhrnpaß (M) det. Dr. Franz; Mühlau (Dr. Franz).
- Ceuth. euphorbiae* Bris. Bdf. (M) det. H. Wagner.
- Ceuth. symphyti* Bed. Bdf., Selztal (M).
- Ceuth. angulosus* Boh. Selztal, Bdf. n. selt. (M).
- Ceuth. arquatus* Hbst. Bdf. (M) rev. Dr. Franz.
- Ceuth. campestris* Gyll. Selztal, Bdf. an *Chrysanthenum leucanthemum* hfg. (M).
- Ceuth. triangulum* Boh. Selztal, Bdf. (M).
- Ceuth. rugulosus* Herbt. Bdf. an Kamillen (M).

- Ceuth. melanosticus* Marsh. Selztal, Bdf. n. s. (M).
- Ceuth. marginatus* Payk. Selztal, Bdf. (M).
- Ceuth. punctiger* Gyll. Selztal, Bdf., Oppenberg hfg. (M).
- Ceuth. pleurostigma* Marsh. Bdf., Kaiserau n. selt. (M).
- Ceuth. dubius* Brls. Kalbling b. A. (hochalpin) selt. (Dr. Franz) det. H. Wagner.
- Ceuth. griseus* Bris. Selztal, Bdf. (M).
- Ceuth. rapae* Gyll. Selztal (M) det. H. Wagner, O. Zeiring? (M).
- Ceuth. inaffectatus* Gylly. Selztal, Bdf. an Nachtviolen in Baumgärten (M) (det. H. Wagner), Kammern (M).
- Ceuth. assimilis* Payk. Bdf. hfg. an Kreuzblütlern (M).
- Ceuth. curvirostris* Schultze. Kaiserau (M) det. H. Wagner.
- Ceuth. cochleariae* Gyll. Liezen, Bdf., Gesäuse hfg. (M) det. Dr. Franz.
- Ceuth. nanus* Gyll. Mautern, Kraubath (M).
- Ceuth. atomus* Boh. Bdf., Wörschach n. selt. (M).
- Ceuth. quadridens* Panz. Selztal, Bdf., hfg. (M).
- Ceuth. sulcicollis* Payk. Bdf. (M).
- Ceuth. pervicax* Ws. Kaiserau, Pyhrnpaß, Paß Stein, Tbt., Gesäuse, Singsdorf b. Rottenmann. An *Dentaria enneaphyllos* hfg. (M). Kalblinggatterl (Dr. Franz).
- Ceuth. erysimi* F. Selztal an Kreuzblütlern gemein (M).
- Ceuth. contractus* Marsh. Selztal, Oppenberg hfg. (M).
- Ceuth. chalybaeus*. Bdf., Selztal (M).
- Ceuth. Rübsameni* Kolbe. Bdf. (M).
- Orobitis cyaneus* L. Bdf., Oppenberg an Hundsveilchen (*Viola canina*) (M), Moorwirtschaft b. A. auf *Viola*-Arten (Dr. Franz).
- Baris laticollis* Marsh. Kraubath (M).
- Limnobaris pilistriata* Steph. Bdf. (M).
- Linin. pusio* Boh. Selztal, Bdf. .
- Calandra granaria* L. Admont im Reis 1 St. gefunden (aus Triest eingeschleppt), leg. Dr. Genger; Döllach (M).
- Cal. oryzae* L. Selztal (M).
- Curculio (Balaninus) pellitus* Boh. Bdf. an Eiche (M).
- Curc. venosus* Grav. Bdf. an Eiche (M).
- Curc. nucum* L. U. v. A., auch am Ennsufer n. selt. (K), Bdf. (M).
- Curc. glaudium* Marsh. Bd. ♂♀ (M), Scharsdorf b. Trofaiach 1 St. (leg. Samos).
- Curc. cerasorum* Payk. (Herbst). Bdf. im Juli bis September auf Grauerle (M).

- Curc. (Balanobius) crux* F. U. v. A. (K), Bdf., Paß Stein n. selt. (M).
- Curc. salicivorus* Payk. Spitzbachgraben (K), Bdf. hfg. (M).
- Curc. pyrrhoceras* Marsh. Bdf. (M).
- Curc. pyrrhoceras a. uniseriatus* Reitt. Bdf. (M).
- Anthonomus varians* Payk. T.-Geb., Aigen b. A. im Moor von Legföhren geklopft n. selt. (K) (det. Dr. Franz); Bdf., Gesäuse, Geb., Flitzen auf Krummholz hfg. (M).
- Anth. varians a. rufipennis* Gerh. Bst., T. Geb. (M).
- Anth. rubi* Herbst. Bdf., Hhd., Flitzen (M).
- Anth. pubescens* Payk. Selztal, Oppenberg (M).
- Anth. pyri* Kollar (= *cinctus* Redt.). Selztal (M).
- Anth. pedicularis* L. Bdf. (M).
- Anth. pomorum* L. U. v. A., Kreuzkogel (K), Bdf. (M).
- Anth. humeralis* Panz. Bdf. (M).
- Furcipes* (= *Anth.*) *recti rostris* L. U. v. A. n. selt. (K), Bdf. (M).
- Brachonyx pineti* Payk. Bdf., Gesäuse (M).
- Acalyptus carpini* Herbst. Admont am Ennsufer (K), Bdf. (M).
- Acal. carpini a. alpinus* Villa. Selztal (M).
- Acal. sericeus* Gyll. Bdf., Pyhrnpaß (M).
- Elleschus scanicus* Payk. Bosruck, Paß Stein selt. (M).
- Elles. bipunctatus* L. Aigen b. A., Gams b. H. n. selt. (K), Oppenberg (M).
- Tychius lineatulus* Steph. Kaiserau, Bdf., Stainach (M).
- Tych. venustus a. pseudogenistae* Pen. Kraubath (M).
- Tych. junceus* Reich. Gesäuse, Stainach (M).
- Tych. haematopus* Gyll. Mautern (M) (det. Dr. Franz).
- Tych. tomentosus* Herbst. Bdf., Gesäuse, Aussee, hfg. (M).
- Miccotrogus* (= *Tych.*) *picrostris* F. Selztal, Bdf. (M).
- Sibinia fugax* Germ. Kraubath (M) det. Dr. Franz.
- Sib. primitta* Hbst. (= *signata* Gyll.) Bdf. (M).
- Sib. viscariae* L. Gesäuse, Kraubath, Windischgarsten (M).
- Anoplus plantaris* Naezen. U. v. A., Kematen n. selt. (K), Bdf. (M).
- Anop. roboris* Suffr. Selztal, Bdf. (M).
- Anop. setulosus* Kirsch. Bdf., Selztal, Gesäuse (M).
- Rhynchaenus* (= *Orchestes*) *quercus* L. Liezen (M).
- Orchestes fagi* L. Mühlau b. A. (K), Liezen, Strechau, Sek. Z., T. Geb. an Buchen gemein (M).
- Orch. testaceus* Müller. Gesäuse, Hschwg. (K), Selztal, Bdf., Oppenberg (M).

- Orch. testaceus a. semirufus* Gyll. Krumauer Moor b. A. (K),
Gesäuse (M).
- Orch. testaceus a. pubescens* Steph. Selztal (M).
- Orch. lonicerae* Herbst Wörschach (M).
- Orch. rusci* Herbst Aigen und Krumau b. A. (K), Bdf. (M),
n. selt.
- Orch. decoratus* Germ. Selztal, Bdf. (M).
- Orch. salicis* L. Kaiserau, Bdf. (M).
- Orch. stigma* Germ. Aigen b. A. n. selt., Stein a. M. (K).
- Orch. foliorum* Müll. Kaiserau, Bdf. (M).
- Rhamphus pulicarius* Herbst Selztal, Bdf. (M).
- Mecinus collaris* Germ. Admont, Selztal selt. (M).
- Mec. pyraster* Herbst Selztal, Bdf. hfg. (M).
- Gymnetron rostellum* Herbst Bdf. (M).
- Gym. pascuorum* Gyll. Landl (M).
- Gym. beccabungae* L. Selztal, Bdf. (M).
- Gym. veronicae* Germ. Bdf., Hhd. häufiger als die vorige Art! (M).
- Gym. antirrhini* Payk. Bdf., n. selt. (M).
- Gym. melas* Boh. Mautern (M).
- Miarus graminis* Gyll. Selztal, Oppenberg, Flitzen, Scheiplalm (M).
- Mi. campanulae* L. Bdf., Oppenberg, Flitzen (M).
- Cionus tubeiculus* Scop. U. v. A., Kreuzkogel (K), Selztal (M).
- Cion. scrophulariae* L. U. v. A., Krumau, Veitlgraben n. selt.
(K), Oppenberg, Flitzen (M).
- Cion. hortulanus* Geoffr. Selztal, Bdf. (M).
- Cion. thapsi* F. Die häufigste Art: Selztal, Bdf., Gesäuse (M),
O. Zeiring 1 St. (E).
- Cion. longicollis v. montanus* Wglm. Mautern, Bdf., Leoben (M).
- Cion. Ganglbaueri* Wglm. Bdf., Selztal, Liezen, Mautern (M).
- Cion. alauda* Herbst Bdf., Selztal, Mautern (M).
- Cleopus* (= *Cionus*) *solani* F. Selztal, Bdf., Kaiserau, Mautern (M).
- Nanophyes marmoratus* Goeze. U. v. A. (Ennsufer) (K), Bdf. (M).
- Nanoph. marmoratus a. syriacus* Bris. (= *a. ruficollis* Rey.) Selz-
tal, Bdf. (M).
- Nanoph. marmoratus a. Müller* Reitt. Bdf. (M).
- Magdal. memnonia* Gyll. Bdf., Kraubath (M).
- Magd. linearis* Gyll. Bdf. (M).
- Magd. phlegmatica* Herbst. Bdf., Hhd. an Föhren und Latschen
(M).
- Magd. nitida* Gyll. Selztal, Bdf., Gesäuse, Kalblinggatterl (M).
- Magd. violacea* L. U. v. A. (K), Bdf. (M).

- Magd. frontalis* Gyll. Bdf., Hhd., Neumarkt im Murtal (M).
Magd. duplicata Germ. Bdf., Kraubath, Stainach (M).
Magd. Weisei Schreiner. Selztal (M).
Magd. armigera Geoffr. Bdf. (M).
Magd. cerasi L. Bdf. (M).
Magd. barbicornis Latr. Selztal, Bdf. (M).
Magd. ruficornis L. Aigen b. A. (K), Bdf., Selztal (M).
Apion stolidum Germ. Bdf., Wörschach (M).
Ap. carduorum Kirb. Bdf. (M).
Ap. onopordi Kirby. Selztal, Bdf., Liezen (M).
Ap. penetrans Germ. Bdf., Selztal (M).
Ap. alliariae Herbst (= *distans* Desbr.) Bdf. (M).
Ap. fuscirostre F. St. Michael an Besenginster (M).
Ap. compactum Desbr. Kraubath (M).
Ap. corniculatum Germ. Leoben (M).
Ap. elongatulum Desbr. Kraubath, Leoben (M).
Ap. ochropus Germ. U. v. A. und am Ennsufer n. selt. (K),
 Bdf., Oppenberg (M).
Ap. craccae L. Selztal (M).
Ap. cerdo Gerst. Kematen (K), Selztal, Bdf. (M).
Ap. subulatum Kirby. Selztal (M).
Ap. radiolus Kirb. Bdf., Liezen (M).
Ap. ebenium Kirb. O. Zeiring (M).
Ap. laevigatum Payk. Bdf. (M) (det. H. Wagner), Selztal, Landl (M).
Ap. dispar Germ. Bdf., Selztal (M) (det. Dr. Franz), Stainach (M).
Ap. urticarium Hbst. Bdf. auf Brennesseln n. selt. (M)
Ap. flavofemoratum Hbst. Kraubath (M).
Ap. pallipes Kirby. Selztal, Pürgg, Kalbinggatterl (M).
Ap. pubescens Kirb. Bdf. (M).
Ap. seniculus Kirb. Bdf., Flitzen gemein (M).
Ap. vicinum Kirb. Bdf., Selztal (M).
Ap. atomarium Kirb. Bdf., Stainach (M).
Ap. millum Bach. Bdf., 1 St. (M).
Ap. rubens Steph. Bdf., 1 St. (M).
Ap. frumentarium Payk, Selztal, Bdf. n. selt. (M).
Ap. frument. v. cruentatum Walt. Bdf., Selztal (M).
Ap. minutum Germ. Admont an der Enns 1 St. (K) (det. Dr.
 Franz), Bdf., Wörschach (M).
Ap. filirostre Kirb. Stainach, Mautern (M).
Ap. flavipes Payk. Selztal, Bdf., Oppenberg (M).
Ap. ononicola Bach. Selztal, Bdf., Stainach (M).

- Ap. assimile* Kirb. U. v. A. (K), Selztal, Oppenberg (M).
Ap. apricans Hbst. Aigen (Ennswiesen) 2 St. (K), Selztal, Oppenberg (M).
Ap. varipes Germ. Bdf., Selztal (M).
Ap. aestivum Germ. Aigen (Ennswiesen) (K), Stainach (M).
Ap. malvae F. Gaishorn (M).
Ap. curtirostre Germ. Bdf., Selztal (M).
Ap. simum Germ. Bdf. (M).
Ap. sedi Germ. Bdf., Gesäuse (M).
Ap. marchicum Herbst. Selztal, Bdf. (M) det. H. Wagner.
Ap. violaceum Kirby. Selztal, Bdf. (M).
Ap. minimum Hbst. Selztal, Bdf., Gesäuse (M).
Ap. Gyllenhali Kirb. Selztal, Bdf., Stainach (M).
Ap. platalea Germ. Landl (M).
Ap. Spencei Kirb. Bdf., Oppenberg, Haus hfg. (M).
Ap. vorax Hbst. Bdf. (M).
Ap. viciae Payk. Bdf., Selztal (M).
Ap. pisi F. St. Martin an der Enns (M) det. Dr. Franz.
Ap. punctigerum Payk. Admont, Bdf., Wörschach n. selt. (M).
Ap. aethiops Hbst. Bdf., Selztal, Oppenberg (M).
Ap. pavidum Germ. Bdf., St. Martin an der Enns (M).
Ap. ervi Kirb. Bdf. hfg. (M).
Ap. simile Kirb. Selztal (M).
Ap. ononis Kirb. Wörschach (M).
Ap. Curtisi Steph. Kaiserau, Landl, Wörschach auf *Crepis comosa* n. selt. (M).
Ap. astragali Payk. Bdf., Stainach, Kammern (M), Dörfelstein b. Hall auf *Astragalus glycyphyllos* (Dr. Franz).
Ap. virens Hbst. Selztal, Bdf. gemein (M).
Ap. tenue Kirb. St. Martin a. d. Enns, Bdf., Mautern (M).
Ap. loti Kirb. Kaiserau, Selztal, Bdf. hfg. (M).
Ap. columbinum Germ. Selztal, Strechau. (M).
Deporans (= *Rhynchites*) *betulae* L. Krumauer- und Aigner Moor n. selt. (K), Selztal (M).
Deporans (= *Rhynchites*) *Mannerheimi* Humm. Selztal selt. (M).
Coenorrhinus (= *Rhynchites*) *nanus* Payk. Gesäuse, U. v. A., Krumauer Moor n. s. (K), Bdf., Wald (M).
Coen. (= *Rhyn.*) *tomentosus* Gyll. U. v. A. (K), Bdf., Selztal (M).
Coen. (*Rhyn.*) *germanicus* Hbst. Bdf. (M).
Rhynchites cupreus L. Aigen b. A. z. hfg. (K), Bdf., Oppenberg (M).

Rhyn. bacchus L. Selztal (M).

Byctiscus populi L. Bdf., Selztal n. selt. (M).

Byct. betulae L. Selztal selt. (M).

Attelabus nitens Scop. Bdf. an Eichentrieben (M).

Apoderus coryli a. collaris Scop. Gesäuse, Spitzenbachgr. (K), Selztal, Bdf. (M).

Apot. coryli a. Fiorii Gort. Aigen b. A., Gams b. H. (K), Selztal (M).

Apot. coryli a. dubia Gort. Gesäuse (K), Admont, Bdf. (M).

Nemonychidae.

Rhinomacer attelaboides F. Bdf. (M).

Diodyrrhynchus austriacus Oliv. Bdf. (M).

Scolytidae. (Ipidae.)

Scolytus (= Eccoptogaster) mali Bechst. Bdf. an Apfelbäumen (M).

Scolytus (= Eccoptogaster) rugulosus Ratz. Bdf. an Zwetschgenbäumen (M).

Phthorophloeus spinulosus Rey. Bdf. Kaiserau (M).

Hylesinus crenatus F. Bdf. (M).

Hyles. fraxini Panz. Bdf. (M).

Blastophagus (= Myelophilus) piniperda L. Bdf. (M).

Dendroctonus micans Kugel. Selztal, Kallwang (M).

Xylechinus (= Kissophagus) pilosus Ratz. Bdf. (M).

Polygraphus polygraphus L. Bdf., Scheiplalm (M).

Hylurgops (= Hylastes) glabratus Zett. Scheiblegger-Niederalm, Scheiblalm (Bösenstein) (K), Bdf. (M).

Hylurgops (= Hylastes) palliatus Gyll. U. v. A. (K), Gesäuse, Bdf. (M).

Hylastes cunicularis Er. U. v. A., Scheiblegger-Niederalm, Gesäuse, Landl z. hfg. (K), Bdf., Hhd., T. Geb. (M).

Hyl. angustatus Herbst. Bdf. (M).

Hyl. attenuatus Er. Bdf. (M).

Crypturgus pusillus Gyll. Admont (leg. Plaschil), Bdf., Selztal n. selt. (M).

Cryphalus piceae Ratz. Bdf., Selztal (M).

Cryph. abietis Ratz. Bdf., Kaiserau (M).

Cryph. saltuarius Weise. Bdf., Scheiplalm (M).

Cryph. intermedius Ferr. Bdf. (M).

Pityophthorus lichtensteini Ratz. Bdf. (M).

Pit. glabratus Eichh. Bdf. (M).

Pit. pityographus Ratz. (= *micrographus* L.). Selztal, Kalblinggatterl (M).

Pityogenes chalcographus L. U. v. A. hfg. (K), Kaiserau, Hhd. (M).

Pityog. trepanatus Nördl. Neumarkt im Murtal (M).

Pityog. bidentatus Herbst. Bdf. (M).

Pityog. quadridens Hartig, Kreuzkogel an einem Schneefleck im Juli 1 St. (K), Kalblinggatterl, Bst., Bdf. (M).

Ips cembrae Heer. Durch die ganze Waldregion an Lärchen: Stein a. M. — Vorberge (K), Bdf., Kaiserau (M).

Ips amitinus Eichh. Gesäuse, Geierkogel (K), Kaiserau (M).

Ips typographus L. U. v. A., z. hfg., Gesäuse, Scheiblegger-Niederalm, Landl (K).

Ips acuminatus Gyll. U. v. A. z. hfg. (K).

Orthotomicus (= *Ips*) *laricis* F. U. v. A. (K), Bdf., Oppenberg (M).

Orth. (= *Ips*) *suturalis* Gyll. Bdf., Selztal (M).

Xylocleptes bispinus Duft. Stainach an Waldrebe (M).

Dryocoetes autographus Ratz. U. v. A., Kaiserau, Scheiblegger-Niederalm (K), Hhd., Stoder Z. (M).

Dry. alni Georg. Kaiserau, Hhd. (M).

Xyleborus dispar F. Bdf., Selztal (M).

Trypodendron (= *Xyloterus*) *domesticum* L. Gesäuse (K), Bdf., Kaiserau, Strechau (M).

Trypod. (= *Xylot.*) *lineatum* Ol. U. v. A. n. hfg., Kaiserau (K), Kalblinggatterl (M).

Lucanidae.

Lucanus cervus L. Gams b. H. brachten die Kinder vereinzelt zur Schule mit. (Hannerl Kiefer.) Sonst nirgends im Gebiet gefunden! (K).

Dorcus parallelopedius L. Palfau im August (leg. P. Bonifaz Seebacher).

Systemocerus caraboides L. U. v. A., Gesäuse, Mühlauerwald im Sonnenschein schwärzend im Mai und Juni z. hfg. (blaue und grüne Stücke) (K).

Ceruchus chrysomelinus Hochw. Gesäuse, auf frischgefälltem Lärchen- und Fichtenholz, auch schwärzend im Sonnenlicht angetroffen. Mitte Juni bis Mitte Juli z. selt. (K).

Sinodendron cylindricum L. Admont und Umgebung einzeln (K), Student Pölzer brachte mir eine größere Anzahl von ♂♂ und ♀♀ am 5. März, die er im Mulm einer alten Linde am Stiftsteich fand. (K.) Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).

Scarabaeidae.

- Trox scaber* L. Bdf. (M).
- Rhyssemus germanus* L. (= *asper* Fab.) Kraubath (M).
- Oxyomus silvestris* Scop. U. v. A., Gesäuse (Weg z. Tbt.) (K), Selztal gemein (M).
- Aphodius erraticus* L. a. *limitinus* A. (= *lineatus* Torre), Selztal, Bdf. (M).
- Aph. erraticus* a. *fumigatus* Mulls. O. Zeiring 1 St. (E).
- Aph. fossor* L. U. v. A. und Krumau im Mai hfg., Selztal, Bdf. (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Aph. fossor* a. *silvaticus* Ahr. Selztal, Bdf. (M).
- Aph. haemorrhoidalis* L. Bdf., Flitzen, Wörschach hfg. (M).
- Aph. brevis* Er. Liezen (M).
- Aph. fimetarius* L. U. v. A., Selztal, Gesäuse, Bdf. überall hfg. (K & M). Hhd. (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- Aph. fimetarius* a. *foetens* Fab. Selztal (M).
- Aph. scybalarius* F. U. v. A. (K), Bdf. (M).
- Aph. scyb.* a. *conflagratus* Fab. (Oliv.). Bdf. (M).
- Aph. rufus* Moll. Selztal, Oppenberg (M).
- Aph. gibbus* Germ. Sub-hochalpin: Kaiserau, Seck. Z., T. Geb., Stoder Z., Tbt. Hhd. (M).
- Aph. piceus* Gyll. Kreuzkogel auf einem Schneefleck 1 St. im August (K). Kaiserau, Wald, Seck. Z. (M).
- Aph. ater* De Geer Mautern, Bdf., Selztal (M).
- Aph. constans* Duft. Selztal (M).
- Aph. putridus* Herbst. Pyhrgasgatterl, Arlingsattel, Hhd. (M).
- Aph. put.* a. *uliginosus* Hardy. Kalblinggatterl, Arlingsattel (M).
- Aph. put.* a. *transitus* Reitt. Hhd. (M).
- Aph. alpinus* Scop. Sub- und hochalpin n. selt. T. Geb., Stein a. M., Gumpeneck, Rößl (K), Kaiserau, Hhd. (M).
- Aph. alpinus* a. *rubens* Comolli (*Schmidti* Heer) Hhd., Zeyr. K., Geierkogel, T. Geb. n. selt. (K).
- Aph. corvinus* Er. Selztal, Bdf. bei Wildfütterungen (M).
- Aph. pusillus* Herbst. Bdf., Kraubath (M).
- Aph. obscurus* F. Sub- und hochalpin: Hhd., Zeyr. K., Stoder Z., T. Geb. (M & K), Kreuzkogel, Stein a. M. n. selt. (K), Himmeleck (leg. Wolf).
- Aph. sticticus* Panz. Bdf., Wörschach, Mautern (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Aph. distinctus* Müll. (= *inquinatus* Herbst). Selztal, Bdf. (M).

- Aph. tessulatus* Payk. Selztal, Bdf. (M).
- Aph. prodromus* Brahm. U. v. A., Hall b. A., Mühlau hfg. (K).
- Aph. sphacelatus* Panz. Bdf. (M).
- Aph. sphacel. a. punctatosulcatus* Sturm. U. v. A., Hall b. A. hfg. (K).
- Aph. mixtus* Villa. T. Geb., Zeyr. K., Gumpeneck (K), Hhd., Prebichl (M).
- Aph. montivagus* Er. Hochalpin unter Steinen, Tbt., Sparafeld (M), T. Geb. (M & K).
- Aph. praecox* Er. Hochalpin im Urgebirge: Hhd., Seckauer Z. (M), Hschwg., Zeyr. K., Stein a. M., Zirbitzk., Rößl überall, aber vereinzelt (K).
- Aph. rufipes* L. T. Geb., St. Lorenzen i. P., Trieben, U. v. A. einzeln (K), O. Zeiring 1 St. (E).
- Aph. depressus* Kugel. Vereinzelt subalpin in Dünger: Kaiserau, Prebichl, Bdf., Oppenberg (M), Sulzkarhund, U. v. A. (K).
- Aph. depressus a. atramentarius* Er. Admont, Hhd., Landl, Gesäuse, Veitlgraben, T. Geb. (K), Himmeleck (leg. Wolf); überall gemein (M), O. Zeiring 1 St. (E).
- Aegialia sabuleti* Panz. (Payk.) Oppenberg 1 St. in einer Sandgrube (M).
- Geotrupes spiniger* Marsh. U. v. A. (K), Bdf. (M).
- Geotr. stercorarius* L. U. v. A. n. hfg. (K), Bdf. (M), O. Zeiring 2 St. (E).
- Geotr. stercorosus* Scriba. Gesäuse, Pitzalm, Tricben, St. Lorenzen i. P., Gams b. H., häufiger als *stercorarius!* (K), Triebenfeldkogel (leg. Wolf), T. Geb. (M), O. Zeiring 1 St. (E), U. v. A. [Koralpe b. 1400 m (K)].
- Geotr. vernalis* L. Admont und Gesäuse einzeln (K), Geierkogel (M).
- Geotr. vernalis v. autumnalis* Heer. Gesäuse, Gams b. H. (K).
- Geotr. alpinus* Hagenb. Alpin n. selt.: Spitzenbachgraben, Gesäuse, Kreuzkogel, Kamleralm, Natterriegel, Sulzkarhund, Pyhrgas, Prebichl, T. Geb. (K), Gesäuse, Dachstein (M).
- Onthophagus ovatus* L. Pürgg n. selt. (M).
- Onth. fracticornis* Preyssl. Selztal, Oppenberg, Flitzen (M), T. Geb. (K), O. Zeiring 2 St. (E).
- Onth. nuchicornis* L. Krumau b. A. (K).
- Sericia brunnea* L. Admont am Licht gefangen n. selt., Gesäuse, Reiteralm (Hschwg.) (K), Bdf., Kaiserau, Oppenberg nachts zahlreich im Grase; bei Tag selten (M).

Homaloplia ruricola F. Kraubath, Leoben (M).

Amphimallon (= *Amphimallus*) *solsstitialis* L. Hall b. A., abends an Waldrändern auf Erlen und Haseln schwärzend z. hfg. im Juli (K), Bdf. an Holunder und an Föhren (M).

Melolontha hippocastani F. Admont und Umgebung jahrweise hfg. (K), Bdf., Oppenberg (M).

Mel. hippocastani a. *tibialis* Muls. U. v. A. 2 St. (K).

Mel. hippocastani a. *fuscicollis* Kr. Admont 2 St. (K), Bdf. (M).

Mel. hippocastani a. *rex* Dalla Torre. U. v. A. 1 St. (K), Bdf. (M).

Mel. hippocastani a. *Metzgerli* Westh. U. v. A. 3 St. (K).

Mel. hippocastani v. *nigripes* Com. U. v. A. z. selt. (K), Bdf. (M).

Mel. hippocastani a. *Schwarzii* Kr. U. v. A. 1 St. (K).

Melolontha melolontha L. Admont und Umgebung jahrweise, aber nicht so hfg. als *hippocastani*! (K), Selztal (M). In Bdf. nie gefunden, auch keine Abart! (M).

Mel. melolontha a. *femoralis* Kr. K. v. A. n. selt. (K).

Mel. melolontha a. *albida* Muls. Hall b. A. 1 St. (K).

Mel. melolontha a. *pulcherrima* Dalla Torre. U. v. A. 1 St. (K).

Hoplia philanthus Füessl. Gams b. H. 3 St. (K).

Hopl. farinosa L. U. v. A., Gesäuse, Gams b. H., Hohentauern überall hfg. auf *Spirea* (K).

Anomala dubia Scop. Selztal (M).

An. dubia a. *cyanea* Dalla Torre (syn.) Admont, Selztal, an d. Enns auf Erlen im Juli 3 St. (K).

An. dubia a. *varians* Muls. Admont, an der Enns auf Erlen im Juli 3 St. (K).

An. dubia v. *aenea* De Geer. Admont am Ennsufer an Erlen schwärzend im Juli n. selt., Selztaler Sumpfwiesen, Gesäuse (K),

An. dubia v. *aenea* a. *Frischi* Fab. U. v. A. 1 St. (K).

An. dubia v. *aenea* a. *pygidialis* Schilsky. Admont am Ennsufer auf Erlen im Juli 1 St., Gesäuse an der Enns 1 St. (K).

An. dubia v. *aenea* a. *maculata* Schilsky. Admont am Ennsufer an Erlen im Juli 1 St. (K).

Phyllopertha horticola L. U. v. A. gemein auf Erlen an der Enns, Gams b. H., [Koralpe (Vorberge) unter 1800 m] (K).

Phyll. horticola a. *ustulatipennis* Villa. Kematen, Gesäuse (Ennsufer) einzeln (K).

Gnorimus nobilis L. U. v. A., Spitzbachgraben n. selt. (K), Bdf., Eisenerz (M).

- Gn. nobilis a. cuprifulgens* Reitt. U. v. A., Spitzbachgraben seltener unter der Stammform (K).
- Trichius fasciatus* L. U. v. A., Kaiserau, Kamleralm, Gesäuse, überall auf *Spiraea* hfg. (K).
- Tr. fasciatus a. dubius* Muls. U. v. A., Mühlau einzeln unter der Stammform (K), Selztal (M).
- Oxythyrea funesta* Poda. Selztal, Kraubath (M).
- Cetonia aurata* L. U. v. A., Gesäuse n. selt. (K), O. Zeiring 1 St. (E).
- Cet. aurata a. (syn.) piligera* Muls. Gesäuse 2 St. U. v. A. 1 St. im Juni, Juli (K).
- Cet. aurata a. purpurata* Heer. Gesäuse 3 St. im Juli an der Bahnböschung auf Blumen (K) det. Dr. Franz.
- Cet. aurata a. pisana* Curti. Ebendorf im Gesäuse im Juli 1 St. (H) det. Dr. Franz.
- Liocola lugubris* Hbst. (= *marmorata* Fab.) U. v. A. im Mai auf einer jungen Eiche 1 St., Eichelau b. A. im Juli 1 St. Gams b. H. überall einzeln (K).
- Potosia cuprea v. metallica* Herbst. U. v. a., Gesäuse, Krumauer Moor, Spitzbachgraben, Gams b. H. überall n. selt. (K) det. Dr. Franz, Oppenberg (M).
- Pot. cuprea v. obscura* And. Gesäuse 2 St., davon eines mit auffallend abweichender Zeichnung, und Spitzbachgraben 3 St. (K) det. Dr. Franz.

N a c h t r a g.

Nebria atrata Dej. Auf dem Bösensteingipfel wurden 2 St. gefunden. (M & Dr. Franz.)

F u n d o r t s v e r z e i c h n i s (mit Höhenangaben). zur Coleopterenfauna des steirischen Ennstales.

I. Oberes Ennstal (Strecke Mandling-Liezen):

Aussee 638 m — Zinken 1856 m — Sarstein 1973 m — Oedensee (südlich von Aussee) — Dachstein 2996 m — Haus 698 m — Hauser Kaibling 2015 m — (Die Gebirge südlich der Enns — zwischen Enns und Mur sind die Niederer Tauern mit ihrer höchsten Erhebung, dem Hochgolling 2863 m; sie gehören dem Urgebirge an. Die Fundorte „Styria alpes“ „Steirische Alpen“ beziehen sich auf dieses Gebiet). — Aich 694 m — Pruggern ca. 685 m — Gröbming 675 m — Stoderzinken

2047 m — Öblarn 679 m — Walchengraben bei Öblarn-Gumpeneck 2226 m — St. Martin a. d. Enns 660 m — Paß Stein (zwischen Grimming u. Kamm) — Pürgg 786 m — Wörschachwald — Donnersbach 690 m — Stainach 643 m — Wörschach (Schwefelbad und Klamm) 640 m — Steyerersee (liegt in 1457 m Höhe westlich vom Hochmölbing im Totengebirge) — Liezen 659 m — Pyhrnpaß (verbindet Steiermark mit Oberösterreich-Oberdonau) — Döllach bei Liezen — Weißenbach bei Liezen (nördlich davon die Warscheneck-Gruppe mit dem Hochmölbing 2351 m.) — Der Fundort „Totesgebirge“ bezieht sich auf das Plateau von Weißenbach = „Hochmölbing-Plateau“ und der Umgebung der Niederhüttenalm in ca. 16—1800 m Höhe. — Almsee im Totengebirge.

II. Strecke Selztal—Admont:

Selztal 634 m (in der Nähe der Paltenmündung in die Enns) — Arnding an der Pyhrnbahn 674 m, die durch den Bosruck-Tunnel nach Spital a. Pyhrn (647 m Seehöhe) führt; dann folgen die Orte Windischgarsten und Klaus, alle in Ober-Donau liegend, ebenso das östlich davon liegende Sengsen-Gebirge, 1961 m — Bosruck 2009 m — Frauenberg a. d. Enns 626 m (vom Edelgraben bei Frauenberg führt der Weg zur Girnalm und zum Dürrnschöberl 1738 m) — Gemeinde Aigen b. Admont (Torfstich), Klosterkogel 1556 m mit Rötelstein — Admont 641 m (Hoffeld, Moorwirtschaft — Kordonwiese-Eichelau) — südlich von Admont neben dem Lichtmeßbach (Veitlgraben) zum Schafferweg und auf das Hochplateau der Kaiserau 1100 m; vom Kematenweg zur Scheiblegger Hochalm und dem Kreuzkogel 2015 m — vom Kalblinggatterl 1540 m zum Kalbling 2012 m und Sparafeld 2245 m — über die Flitzenalm und Treffneralm 1200—1521 m mit der Mödlingerhütte zum Donnerwirt in Johnsbach 773 m — Gemeinde Krumau (Richtung Gesäuse) mit aufgelassenem Torfstich — Scheiblteich.

Hall bei Admont 671 m (bestehend aus den Gemeinden Ober- und Unterhall) nördlich von Admont am Fuße der Hallermauern (Gstattmaier Niederalm 971 m zum Pyhrgasgatterl 1348 m und Pyhrgas 2244 m) — vom Natterriegel 2063 m abwärts zum Grabnertörl 1900 m mit dem Admonterhaus, über die Kamleralm zur Pitzalm und über dem Dörfelstein 1063 m nach Hall — Längs der Eßling in die Zirnitz (Einsattelung zwischen Leichenberg 1008 m und Pleschberg 1718 m) oder durch den Mühlauer-

wald ins Alpental Mühlau 733 m mit dem stiftischen Elektrizitätswerk.

III. Strecke Gesäuse—Hieflau:

Haltestelle Johnsbach—Johnsbachtal 773 m — Koderalm 1340 m — Heßhütte 1635 — Hochtor 2370 m — Zinödl 2190 m — Sulzkarhund 1750 m — Sulzkar — Hartlesgraben — Hieflau 517 m — oder von der Haltestelle Johnsbach auf der Gesäusestraße (rechts am Heindlkar vorüber) nach Gstatterboden 574 m — Gstatterbodenbauer — Ennstalerhütte 1650 m — Tamisbachturm 2034 m.

IV. Ennstal: Strecke Lainbach—Altenmarkt a. d. Enns:

Lainbach — Landl 496 m — Gams bei Hieflau 500 m — Palfau 496 m — oder von Landl der Enns folgend nach Groß-Reifling 449 m — St. Gallen 513 m (Spitzenbachgraben) — Altenmarkt a. d. Enns 461 m — Voralpe 1727 m.

V. Strecke Hieflau—Eisenerz:

Eisenerz 704 m — Prebichl 1200 m — Erzberg ca. 1070 m — Polster 1911 m — Grübl 1641 m — Rößl 1800 m — Reichensteinhütte 2128 m — Eisenerzer Reichenstein 2166 m.

VI. Palten- und Liesingtal (Strecke Selztal—St. Michael):

Lassing bei Selztal 778 m (am Fuße des Mitterberges) — Strechenwald — Strechau (Schloß und Klamm) — Oppenberg 1060 m — Schüttkogel 2047 m — Hochgrößen 2116 m — Strechengraben — Reiteralm — Hochschwung 2199 m.

Rottenmann 674 m — Rottenmanner Tauern: Globukenalp 1529 m — Globukensee — Stein am Mandl 2042 m — Singsdorferalm (Bärndorf ca. 680 m, St. Lorenzen i. Paltentale) — Hochheide 2336 m — (Trieben 708 m — Sunkgraben — Triebenstein 1811 m) — Griesstein 2338 m — (Hohentauern 1265 m) — Scheiplalm 1700 m — Scheiplsee 1748 m — Bösenstein 2449 m — Geierkogel 2237 m.

Gaishorn 722 m — Gaishornersee (jetzt entwässert!) Treglwang 750 m — Himmeleck 2097 m.

Wald (Walderhöhe-Wasserscheide zwischen Enns und Mur, bzw. Palten und Liesing) 849 m — Seckauer Alpen: Hocheggalm 1368 m — Grieskogel und Saukogel oder Geierhaupt 2518 m — Hochreichart 2417 m — Seckauer Zinken 2398 m — (von der Eggeralm auf den Leobner 2035 m).

Kallwang 753 m — Mautern 713 m — Kammern 665 m (über Scharfsdorf bei Trofaiach zum Reiting 2215 m) — St. Michael 596 m (Mündung der Liesing in die Mur).

VII. Murtal (Strecke Leoben—Predlitz):

Leoben 532 (an der Mündung des Vordernbergerbaches in die Mur) — Kraubath ca. 600 m — Knittelfeld 645 m — Zeltweg 676 m — Obdach 874 m (südlich von Zeltweg) — Kaseralm 1620 m — Zirbitzkogel 2397 m — Oberzeiring (im Pölstale) 930 m — Scheifling 763 m — Neumarkt 842 m — St. Lambrecht ca. 1030 m (beide Orte südlich von Scheifling).

Die Hegeter-Arten der Insel Tenerife (Col. Ten.)

von Dr. D. L. Uyttenboogaart, Heemstede.

Herr Georg Frey in München hat der Entomologischen Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen, indem er den Mut hatte, die Sammlung Kanarischer Coleoptera des Herrn Appenhagen in Tacoronte (Ten.) anzukaufen. Mut brauchte er dazu, weil die Sammlung, infolge jahrelanger Aufbewahrung in der feuchten Wolkenzone, stark verschimmelt war. Mit unendlicher Mühe und Hingebung ist diese größte aller Koleopterensammlungen der Insel Tenerife gereinigt und umpräpariert und bildet jetzt ein für die biogeographische Wissenschaft höchst wertvolles Material.

Nachdem ich mit Dr. Zumpt zusammen die Curculioniden dieser Sammlung bearbeitet hatte, untersuchte ich noch allein eine Anzahl Carabiden und dann hat man mich gebeten, auch das sehr umfangreiche *Hegeter*-Material zu untersuchen und, wenn möglich, eine dichotomische Tabelle zu verfassen, mit deren Hilfe die Arten zu bestimmen seien.

Nach Empfang dieser Sammlung verfügte ich, zusammen mit dem Material meiner eigenen Sammlung und solchem aus anderen Sammlungen, das entweder noch bei mir verweilte oder das ich bereits bearbeitet hatte, über mehr als 2000 Ex. des Genus *Hegeter* der Insel Tenerife.

Wollaston hat bereits die Schwierigkeit erfahren, die Arten, oder was er dafür hielt, zu unterscheiden. Zum Beweise brauche ich nur folgendes zu zitieren aus „Catalogue of the coleopterous Insects of the Canaries“ (1864) p. 451: „Nevertheles I am far from satisfied that the genus is not essentially a variable